



55322 / B

Vol. 2

AA 4032

6 vols.

ZORN

6 vols.

1 leaf 65 / 132 pp. 101 / 200 plates

ICONES  
PLANTARVM MEDICINALIVM.  
CENTVRIA II.

---

Abbildungen  
von  
Arzneypflanzen.

---

Zweytes Hundert.



---

Nürnberg,  
auf Kosten der Kaspischen Buchhandlung.  
1784.



10085

PHARMACEUTICAL

WELLINGTON

WELLINGTON

100

WELLINGTON

WELLINGTON










*Ajuga Pyramidalis*. L.






*Erica vulgaris* . L .



Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
Wellcome Library





## 101. Tafel.

Günsel, Pl. G. 761. 14 Klasse.  
Güldengünsel, Blauer Gutsut.  
Güldenwundkraut. Lorenz-  
kraut.

Linne Pf. S. 7 Th. S. 383.

- a. Die einblättrige halbfünfspaltige haarigte Blumendecke,
- b. Die einblättrige rachenförmige Krone geöffnet, mit den 4 Staubfäden, deren 2 kürzer 2 länger sind.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der 4spaltige Fruchtknoten mit dem langen Griffel und den 2 zarten Narben.

Wächst an Wegen und bergigten trockenen Gegenden, ohngefähr einen halben Fuß hoch, blüht im Junius und Julius.

Dieses ist die eigentliche *Consolida media*, an deren Stelle aber meistens die *Tab. XI.* abgebildete *Ajuga reptans* genommen wird.

## Tab. 101.

*Ajuga pyramidalis*. Cl. XIV.

*Ajuga tetragono pyramidalis villosa*, foliis radicalibus maximis. L. 438.

*Consolida media pratensis coerulea*. Bugula.

- a. Perianthium monophyllum, Semiquinquefidum villosum.
- b. Corolla monopetala ringens aperta, cum staminibus 4, quorum 2 breviora, 2 longiora.

c. Stamen separatum,

d. Germen quadrifidum cum stylo longo et duobus stigmatibus tenuibus.

Crescit ad vias, loca sicca montosa &c. Floret Iunio et Iulio altitudine circiter semipedali.

Haec est *Consolida media* proprie dicta, cuius autem loco falso plerumque illa, *Tab. XI.* depicta, *Ajuga reptans* sumitur.

## 102. Tafel.

Heide. Pl. G. 523. 8 Klasse.  
Heidekraut.

Linne Pf. S. 3 Th. S. 424.

- a. Die 4blättrige Blumendecke.
- b. Eben diese nebst der zwoten deren 4 kleine Blättgen herunter hängen und sich an den Stiel anschließen.
- c. Die 4blättrige äussere Krone deren Blättgen nicht zusammenhängen, in dieser ist

## Tab. 102.

*Erica vulgaris*. Cl. VIII.

*Erica antheris aristatis, corollis campanulatis subaequalibus, calycibus duplicatis, foliis oppositis sagittatis*. L. 301.

- a. Perianthium tetrachyllum.
- b. Idem cum duplice, quorum 4 petala parva dependunt et pedunculo annexae sunt.

c. Corolla tetrapetala exterior, petalis non connexis, ambiens

J 2

d. Co-





- d. die innere einblättrige, tief 4spaltige Krone, mit den Geschlechtstheilen.
- e. Die 8 Staubfäden mit ährenähnlichen 2 spitzigen Staubbeuteln.
- f. Einer derselben geschlossen und
- g. geöffnet.
- h. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 4spaltigen Narbe.

Wächst auf trockenen dürren Heiden bis gegen 2 Fuß hoch, blüht im August und September.

- d. Corollam internam monopetalam profunde quadripartitam, cum genitalibus.
- e. Stamina 8 antheris aristatis bifidis.
- f. Filamentum anthera clausa.
- g. aperta.
- h. Germen cum stylo et stigmate quadrifido.

Crescit in locis aridis desolatis ad altitudinem bipedalem, floret augusto et septembre.

### 103. Tafel.

Bingelkraut. Pl. G. 1225. 22 Klasse.

Bingelkraut. Hundstohl.

Speckmelde. Küßkraut

Linne Pl. S. 10 Th. S. 292.

Männliche Pflanze

- a. Die 3theilige Blumendecke.
- b. Die 12 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter mit dem 2knöpfigen Staubbeutel.

### 104. Tafel.

Bingelkraut. Siehe vorhergehende Tafel.

Weibliche Pflanze.

- a. Eine unbefruchtete weibliche Blume, deren oft viele an einer Pflanze stehen bleiben.
- b. Die 3theilige Blumendecke.
- c. Die 2 Honigbehälter, die man auch an der Seite des Fruchtknotens e. gewahrt wird.
- d. Der borstige Fruchtknoten, mit den 2 Griffeln und dem Kelche.

### Tab. 103.

Mercurialis annua. Cl. XXII.

Mercurialis caule brachiato, foliis glabris floribus spicatis. L. 746.

Mercurialis testiculata f. mas. Planta mascula.

- a. Perianthium tripartitum.
- b. Stamina duodecim.
- c. Stamen separatum cum anthera didyma.

### Tab. 104.

Mercurialis annua. Vide Tab. antecedentem.

Planta foeminea.

- a. Flos foemineus sterilis, quorum plures saepius in planta remanent.
- b. Perianthium tripartitum.
- c. Nectaria duo, quae etiam a latere germinis, e, compinguntur.
- d. Germen hispidum cum stylis 2 et perianthio.

e. Cap-







*Mercurialis annua* Mas. L.





*Mercurialis annua. Foemina. L.*









*Asparagus Officinalis. L.*





*Polygonum jagopyrum*, L.





a. Die hodenförmige 2fächerige Frucht, mit dem Honigbehalter.

f. Ebendiese aufgeschnitten, mit den 2 Saamen.

g. Saamen.

Wächst als Unkraut in Gärten, Weinbergen etc. wird ohne Gefähr 1 Fuß hoch, blüht im Julius oder August.

Die männlichen (der vorhergehenden Tafel) und die weiblichen wachsen immer nahe beisammen.

### 105. Tafel.

Spargel. Pl. G. 455. 6 Klasse.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 320.

a. Die 6blättrige Krone.

b. Eben diese geöffnet mit den 6 Staubfäden.

c. Ein abgesonderter Staubfaden.

d. Der zefigte Fruchtknoten mit der Narbe.

e. Die zeitigen Beere.

f. Die 2 Saamen.

Wird meistens in Gärten gezogen, 3-4 Fuß hoch, blüht im Junius.

### 106. Tafel.

Knöterich. Pl. G. 535. 8 Klasse.  
Heidekorn. Buchweizen,  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 457.

a. Die 5blättrige Krone.

b. Die 8 Staubfäden mit den 3 Stempeln.

c. Ein abgesonderter Staubfaden.

e. Capsula scrotiformis, bilocularis, cum nectario.

f. eadem aperta, cum 2 seminibus.

g. Semina.

Crescit ut mala herba in hortis et vineis, altitudine circiter pedali, floret Julio et Augusto.

Mascula planta (Tab. praeced.) et foeminea semper vicina.

### Tab. 105.

Asparagus officinalis. Cl. VI.

Asparagus caule herbaceo tereti erecto foliis setaceis, stipulis paribus. L. 274.

a. Corolla hexapetala.

b. eadem aperta, cum staminibus 6.

c. Stamen separatum.

d. Germen trigonum, cum stigmate.

e. Baccae maturae.

f. Semina bina.

Colitur plerumque in hortis, altitudine 3-4 pedali, floret Junio.

### Tab. 106.

Polygonum fagopyrum. Cl. 8.

Polygonum foliis cordato sagittatis, caule erectiusculo inermi. Seminum angulis aequalibus. L. 313.

Fagopyrum. Triticum faginum.


a. Corolla pentapetala.

b. Stamina 8 cum 3 pistillis.

c. Stamen separatum.

J. 2

d. Ger-



- d. Der 3seitige Fruchtknoten mit den 3 Griffeln und den runden Narben.

Wächst in Aekern oder wird in Gärten gezogen, wird gegen 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

### 107. Tafel.

Ressel. Pl. G. 1143. 21 Klasse.

Römische Ressel.

Linne Pf. S. 10 Th. S. 171.

Männliche Blüthe.

- a. Die 4blättrige Blumendecke von aussen.
- b. Eben diese von innen mit den 4 Staubfäden.
- c. Die 4 Staubfäden mit dem Honigbehältniß in der mitten.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden, mit dem 2fächerigen Staubbeutel, der sich endlich in 3 Blättgen zertheilt.

Weibliche Blüthe auf dergleichen Pflanze.

- e. Die 2klappigte Blumendecke.
- f. Der Fruchtknoten mit der Narbe, vergrößert.
- g. Der geschlossene Kelch mit dem Saamen.
- h. Eine Kugel aus lauter solchen herzförmigen Kapseln.

Bei uns wird diese in Gärten gezogen, sie wächst gegen 2 Fuß hoch, und blüht im Junius.

### 108. Tafel.

Bibernell. Pl. G. 394. 5 Klasse.

Pimpinell. Steinpeterlein.

Linne Pf. S. 6 Th. S. 201.

- a. Die 5blättrige besondere Krone von unten mit der kaum merklichen Blumendecke.

- d. Germen triquetrum cum stylis 3 et antheris subrotundis.

Crescit in agris vel in hortis colitur, altitudine bipedali, floret Iunio.

### Tab. 107.

*Urtica pilulifera*. Cl. XXI.

*Urtica foliis oppositis ovatis serratis, amentis fructiferis globosis*, L. 709.

Flos masculus.

- a. Perianthium tetraphyllum a parte exteriore.
- b. Idem ab interiore parte cum Staminibus 4.
- c. Stamina 4 cum Nectario in Centro.
- d. Stamen separatum cum anthera biloculari quod se in 3 folia tandem dividit.

Flos foemineus in eadem planta.

- e. Perianthium bivalve.
- f. Germen cum stigmatibus, magnitudine aucta.
- g. Perianthium connivens cum seminibus.
- h. Globula ex talibus perianthiis cordiformibus composita.

Colitur apud nos in hortis, altitudine circiter bipedali crescit, et Iunio floret.

### Tab. 108.

*Pimpinella magna*. Cl. V.

*Pimpinella foliolis omnibus lobatis, impari trilobo*, L. 241.

*Pimpinella saxifraga maior, umbella rubente*.

- a. Corolla propria pentapetala a parte inferiore, cum perianthio vix notabili.

b, Eadem







*Urtica pilulifera* . L .





*Pimpinella magna*. L.










*Sanicula Europaea* . L .



*Lathraea Squamaria*. L.







- b. Eben diese von oben mit den 5 langen Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der Fruchtknoten mit den 2 aneinander liegenden Griffeln und den runden Narben.
- e. e. Die Frucht.
- f. Die 2 Samen.

Diese ist die eigentliche gute Berg-Bibernell, meistens ist die Blüthe weiß, und diese rothe ist nur eine Abänderung davon. Sie wächst bei 4 Fuß hoch, und blüht im Junius. Sie macht sehr viele Aeste.

### 109. Tafel.

Sanikel. Pl. G. 354. 5 Klasse.  
Bruchkraut.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 15.

- a. Die besondere 5theilige Blümgenhülle.
- b. Die 5blättrige Krone mit den 5 langen Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden mit dem Kronblatt.
- d. Der vorstige Fruchtknoten, mit den 2 zurückgeschlagenen Griffeln.

Wächst in schattigten Wäldern, gegen 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

### 110. Tafel.

Schuppenwurz. Pl. G. 799. 14 Klasse.  
Zahnkraut. Ohnblatt.  
Strenbelwurz. Kreuzwurz.  
Mairwurz. Raalkraut.  
Linne Pf. S. 8 Th. S. 23.

- a. Die einblättrige 4spaltige Blumendecke.

- b. Eadem à superiore parte cum 5 staminibus.
- c. Stamen separatum.

- d. Germen cum stylis 2 contingentibus et antheris subrotundis.

- e. e. Fructus,
- f. Semina bina.

Species haec optima illa Pimpinella montana est, saepius flore albo gaudet, rubra haec varietas est.

Crescit altitudine 4 pedum, floret Iunio; forte ramosa est.

### Tab. 109.

Sanicula europaea. Cl. V.  
Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. L. 225.

- a. Perianthium parziale 5 partitum.
- b. Corolla 5 petala cum staminibus 5 longis.
- c. Stamen separatum cum petalo.
- d. Germen hispidum, cum stylis 2 reflexis.

Crescit in sylvis nemorosis, altitudine circiter bipedali, floret Iunio.

### Tab. 110.


Lathraea squamaria. Cl. XIV.  
Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiori trifido. L. 461.

Anblatum flore e rufo candicante.

Dentaria maior.

- a. Perianthium monophyllum quadrifidum.

b. Co-



- b. Die einblättrige rachenförmige Krone.
- c. Eben diese geöffnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.
- d. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der überhangenden Narbe.
- e. Die geöffnete Saamentkapsel. Wächst in den dicksten Gebüschern, an den Wurzeln der Stauden, ohngefähr 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im Junius.

### III. Tafel.

Melisse. Pl. G. 784. 13 Klasse.  
 Bergminze. Ackermünze.  
 Bergmelisse. Kalaminthe.  
 Linne Pl. S. 7 Th. S. 539.

- a. Die einblättrige, gestreifte Blumendecke mit 3zähliger zurückgeschlagener Ober- und 2theiliger Unterlippe.
- b. Die einblättrige, rachenförmige Krone mit den 2 längern, und 2 kürzern Staubfäden, aufgeschnitten.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der 4spaltige Fruchtknoten, mit dem langen Griffel und der 2spaltigen Narbe. Wächst in bergigten, sonnenreichen Gegenden, gegen 2 Fuß mit vielen Aesten. Blüht im Julius.

### III 2. Tafel.

Hartriegel. Pl. G. 18. 2 Klasse.  
 Reihnweide. Mundholz.  
 Zaunriegel. Grünfaulbaum.  
 Linne Pl. S. 3 Th. S. 15.

- b. Corolla monopetala ringens.
- c. eadem aperta cum staminibus 4, quorum 2 longiora, 2 breviora.
- d. Germen cum stylo et stigmate nutante.
- e. Capsula seminalis aperta. Crescit in dumetis densissimis, ad eorum radices, altitudine circiter semipedali, floret Iunio.

### Tab. III.

Melissa calamintha. Cl. XIV.  
 Melissa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum. L. 453.

Calamintha montana, magno flore.

- a. Perianthium monophyllum striatum, labio superiore tridentato reflexo, inferiore bipartito.
- b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum 2 staminibus longioribus, 2 brevioribus.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen quadrifidum, cum stylo longo, et stigmate bifido.

Crescit in locis apricis montanis, altitudine 3 pedum, valde ramosa est, et floret Iulio.

### Tab. III 2.

Ligustrum vulgare. Cl. II.  
 Ligustrum vulgare. L. 54.  
 Phylliraea. Dod.

a. Pe-







*Melissa calamintha*. L.



*Ligustrum vulgare*. L.









*Lythrum Salicaria.* L.



*Leonurus cardiaca.* L.







- a. Die einblättrige, sehr kleine, 4zählige Blumendecke.
  - b. Die einblättrige, trichterförmige Krone mit 4theiliger Mündung, und den 2 Staubfäden.
  - c. Der rundlichte Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.
  - d. Die zeitige Frucht.
  - e. Die Keere in die Länge —
  - f. In die Quere durchschnitten.
  - g. Saamen.
- Wächst häufig an Gebegen, 5-6 Fuß hoch, blüht im Junius und Julius.

### 113. Tafel.

Partike. Pl. G. 658. 11 Klasse.  
Rothberz oder Brauner Weiderich  
Linne Pf. S. 7 Th. S. 14.

- a. Die einblättrige gestreifte Blumendecke, mit 12 Zähnen.
- b. Die 6blättrige Krone mit den 12 Staubfäden, deren 6 die Hälfte kürzer sind.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der länglichte Fruchtknoten, mit dem niedergebogenen Griffel und der runden Narbe  
Es finden sich viele Blumen mit 5 Kronblättern, 10 Staubfäden, und einem 10zähligen Kelche.

Wächst an Bächen und in nassen Wiesen. wird ohngefähr 2 Fuß hoch blüht im Julius.

### 114. Tafel.

Welschtrapp. Pl. G. 778. 14 Klasse.

- a. Perianthium monophyllum minimum quadridentatum.
  - b. Corolla monopetala infundibuliformis, limbo quadripartito, et 2 staminibus.
  - c. Germen subrotundum cum stylo et stigmate bifido.
  - d. Bacca matura.
  - e. Bacca longitudinaliter —
  - f. Transversim dissecta.
  - g. Semina.
- Crescit copiose inter dumeta, altitudine 5-6 pedum, floret Iunio et Julio.

### Tab. 113.

Lythrum salicaria. Cl XI.  
Lythrum foliis oppositis cordato lanceolatis, floribus spicatis dodecandris. L. 371.  
Salicaria.

- a. Perianthium monophyllum striatum denticulis 12.
- b. Corolla hexapetala cum staminibus 12, quorum 6 dimidiam partem breviora sunt.
- c. Stamen separatum.

- d. Germen oblongum cum stylo declinato, et stigmate orbiculato.

Inveniuntur plures flores petalis 5, staminibus 10, et calyce 10 dentato.


Crescit ad rivulos, et in pratis humidis, altitudine bipedali, floret Julio.

### Tab. 114.

Leonurus Carduaca. Cl XIV.

8.

Leonu-



Wildmutterkraut. Herzgespann-  
kraut.

Linne Pfl. S. 7 Th. S. 497.

- a. Die einblättrige, 5zählige  
Blumendecke.
- b. Die einblättrige, rachenför-  
mige Krone geöfnet, mit den  
2 längern und 2 kürzern  
Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staub-  
faden, mit dem 2spaltigen  
Staubbeutel.
- d. Die 4 Fruchtknoten mit dem  
Griffel und der 2spaltigen  
Narbe.

Wächst an steinigten unge-  
bauten Orten, wird gegen 3  
Fuß hoch, blüht im Julius  
und treibt viele Seitenäste.

### I 15. Tafel.

Wegerich. Pl. G. 149. 4Klasse.  
Flößsaamentkraut.

Linne Pfl. S. 5 Th. S. 322.

- a. Die 4theilige Blumendecke.
- b. Die einblättrige röhrigte Kro-  
ne, mit 4theiliger Mündung.
- c. Eben diese aufgeschnitten,  
mit den 4 Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter Staub-  
faden.
- e. Der eirunde Fruchtknoten  
mit dem fadenförmigen Griffel  
und der kaum merklichen  
Narbe.

Wird meistens bei uns in  
Gärten gezogen, in wärmern  
Gegenden wächst es in sandig-  
ten Orten bis 1 und ein halben  
Fuß hoch, blüht im Julius.

*Leonurus foliis caulinis lanceo-  
latis trilobis. L. 349.*

*Cardiaca. Marrubium cardiaca  
dictum.*

*Branca s. Pata lupina.*

- a. Perianthium monophyllum 5  
dentatum.
- b. Corolla monopetala ringens,  
aperta, cum staminibus 2 lon-  
gioribus, 2 brevioribus.
- c. Stamen separatum cum an-  
thera bifida.
- d. Germina 4, cum stylo et stig-  
mate bifido.

Crescit in locis ruderalibus,  
altitudine prope 3 pedum, floret  
Iulio, et valde ramosa est.

### Tab. I 15.

*Plantago psyllium. Cl. IV.*

*Plantago caule ramoso herba-  
ceo, foliis subdentatis recur-  
vatis, capitulis aphyllis. L. 132*

*Pulicaria.*

- a. Perianthium quadrifidum.
- b. Corolla monopetala tubulosa,  
ore quadrifido.
- c. Eadem aperta cum stamini-  
bus 4.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen ovatum cum stylo  
filiformi et stigmate vix nota-  
bili.

Colitur plerumque apud nos  
in hortis, crescit in regionibus  
calidioribus in locis sabulosis ad  
altitudinem sesquipedalem, flo-  
ret Iulio.

Tab.







*Plantago psyllium*. L.



*Trigonella foenum-graecum*. L.









*Valeriana officinalis*. L.





*Phalaris Canariensis, L.*





## 116. Tafel.

Betzborn. Pl. G. 967. 17

Klasse:

Linne Pl. S. 8 Th. S. 760.

- a. Die einblättrige halbfünfspaltige Blumendecke.
- b. Die Schmetterlingsförmige 3blättrige Krone, geöffnet.
- c. Die abgesonderte Fahne.
- d. Die Staubfäden in 2 Partheien, 1 allein, 9 beisammen.
- e. Der Stempel.
- f. Die Schote.
- g. Saamen.

Wird bei uns in Gärten oder Aekern gezogen, wächst gegen 2 Fuß hoch, blüht im Julius und August.

## 117. Tafel.

Baldrian. Pl. G. 48. 3 Klasse.

Augenwurzel. Katzenwurz.

Linne Pl. S. 5 Th. S. 178.

- a. Der kaum merkliche Kelch.
- b. Die Krone mit der buchtichten Röhre und 5spaltiger Mündung.
- c. Eben diese aufgeschnitten mit den 3 Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der 3spaltigen Narbe.

Wächst in nassen Wiesen und Wäldern, wird ohngefähr 3 Fuß hoch, blüht im Julius.

## 118. Tafel.

Glanzgras. Pl. G. 80. 3 Klasse.

## Tab. 116.

Trigonella foenum graecum. Cl. XVII.

Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis, caule erecto. L. 576.

- a. Perianthium monophyllum semiquinquefidum.
- b. Corolla papilionacea tripetala aperta.
- c. Vexillum separatum.
- d. Stamina diadelphea, simplex et novemfidum.
- e. Pistillum.
- f. Legumen.
- g. Semen.

Colitur apud nos in hortis vel agris, altitudinem 2 pedum attingit, floret Julio et Augusto.

## Tab. 117.

Valeriana officinalis. Cl. III.

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. 72.

Valeriana minor. Phu vulgare.

- a. Calix vix notabilis.
- b. Corolla tubo gibbo et limbo quinquefido.
- c. Eadem aperta cum staminibus 3.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen cum stylo filiformi et stigmate trifido.

Crescit in pratis humidis et sylvis, altitudine 3 pedali, floret Julio.

## Tab. 118.

Phalaris canariensis. Cl. III.

R 2

Pha-





Kanarisaamen.

Linne Pf. S. Th. S.

a. a. Der einblüthige, 2speltzige Kelch.

b. b. Die 2speltzige Krone.

c. Eben diese geöffnet, mit den 3 Staubfäden.

d. Der Fruchtknoten mit den 2 Griffeln und den haarigten Narben.

e. Saamen.

Wird bei uns in Gärten oder Aekern gezogen, wächst über 2 Fuß hoch, blüht im Julius.

### 119. Tafel.

Nardenaame. Pl. G. 740. 13 Klasse.

Sch. varzer Kummel.

Linne Pf. S. 7 Th. S. 272.

a. Die 5blättrige Krone.

b. Die 8 Honigbehältnisse.

c. Eines derselben von aussen.

d. von innen, mit 2 Löffeln gezeichnet.

e. Die sehr vielen Staubfäden.

f. Ein abgesonderter.

g. Die 5 Fruchtknoten, mit den langen Griffeln und Narben.

Wird bei uns in Gärten gezogen wächst bei uns einen halben Fuß hoch, blüht im Julius.

### 120. Tafel.

Gamander. Pl. G. 762. 14 Klasse

Schlagkraut. Erdkiefer.

Feldchenpreß. Je länger je lieber.

Linne Pf. S. 7 Th. S. 388.

Phalaris panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. L. 88.

Canariense semen.

a. a. Gluma uniflora, bivalvis.

b. b. Corolla bivalvis.

c. eadem aperta cum 3 staminibus.

d. Germinum cum stylis 2 et stigmatibus villosis.

e. Semen.

Colitur apud nos in hortis vel agris; altitudinem bipedalem superat, Iulio floret.

### Tab. 119.

Nigella arvensis. Cl. XIII.

Nigella pistillaris quinque, capsulis muricatis subrotundis foliis subpilosis. L. 421.

Melanthium. Cuminum nigrum.

a. Corolla pentapetala.

b. Nectaria 8.

c. Unum eorum a parte exteriori.

d. ab interiori parte 2 punctis notatum.

e. Stamina numerosa.

f. Stamen separatum.

g. Germina 5, cum stylis longissimis, et stigmatibus.

Colitur apud nos in hortis, altitudine sesquipedali, floret Iulio.


### Tab. 120.

Teucrium chamaepitys. Cl. XIV.

Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus lateralibus solitariis caule diffusis.

Iva arthetica.

a. Pe-





*Nigella Sativa. L.*





*Teucrium chamaepithys*. L.








*Parietaria officinalis*. L.





*Centaurea benedicta*. L.





- a. Die einblättrige halbfünfspaltige Blumendecke.
- b. Die einblättrige rachenförmige Krone geöffnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.
- c. Der 4spaltige Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und den 2 spitzigen Narben.  
Wächst auf Aecern in wärmern Gegenden, wird nicht viel über 1 halben Fuß hoch, blüht im Mai und Junius.

- a. Perianthium monophyllum semiquinquefidum.
- b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus 2 longioribus, 2 brevioribus.
- c. Germen quadripartitum cum stylo filiformi et stigmatibus 2 tenuibus.  
Crescit in agris in regionibus calidioribus, altitudinem semipedalem non multum superat, floret Maio et Iunio.

## 121. Tafel.

Glaskraut. Pl. G. 1256. 23 Klasse.

Tag und Nachtkraut. Peterskraut. Gnadenkraut. Mauerkraut.

Linne Ps. S. 10 Th. S. 317.

- a. 2 Zwitterblumen in einer Hülle, deren 6 Blättgen von einander entfernt sind.
- b. Eine solche Zwitterblume abgesondert
- c. Die einblättrige 4spaltige Blumendecke.
- d. 4 eigentliche, röthlichgefärbte, unten zusammenhängende Kronblättgen
- e. Eben diese geöffnet. mit den 4 Staubfäden und dem Fruchtknoten.
- f. Der abgesonderte Fruchtknoten.
- g. Die weibliche Blume, mit den zwischen 2 Zwitterblumen.
- h. Saamen.


Wächst an Mauern, Gärten, und Wäldern, wird über 2 Fuß hoch mit vielen Seitenästen, blüht im August.

## Tab. 121.

Parietaria officinalis. Cl. XXIII.  
Parietaria foliis lanceolato ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. L. 763.  
Helxine.

- a. Flores 2 hermaphroditi in involucrio, quorum petala 6 dispersa sunt.
- b. Flos hermaphroditus separatus.
- c. Perianthium monophyllum quadripartitum.
- d. Petala propria subrubra in basi contingentia.
- e. eadem aperta, cum staminibus 4 et germine.
- f. Germen separatum.
- g. Flos foemineus in medio duorum florum hermaphroditorum.
- h. Semen.

Crescit ad muros, aedes, et in sylvis, altitudinem bipedalem superat, valde ramosa est, et Augusto floret.



## 122. Tafel.

Flockblume. Pl. G. 1060. 19

Klasse.

Kardobenediktenkraut.

Gesegnete Distel. Spinnen-  
distel.

Linne Pf. S. 10 Th. S. 614.

- a. Der gemeinschaftliche Kelch.
- b. Ein Blatt von diesem mit  
den daran hängenden Sta-  
uben.
- c. Die zusammengesetzte Krone.
- d. Ein abgesondertes Zwitter-  
kröngen mit 5theiliger Mün-  
dung.
- e. Die 5 zusammenhängende  
Staubfäden desselben.
- f. Der davon abgesonderte  
Fruchtknoten mit dem faden-  
förmigen Griffel und der  
Narbe.
- g. Saame mit der Krone.
- h. Ein weibliches Kröngen mit  
dem kleinen Fruchtknoten:  
Wird bei uns in Gärten ge-  
zogen, wächst 2-3 Fuß hoch mit  
vielen Aesten, blüht im August.

## 123. Tafel.

Leberblume. Pl. G. 413. 5

Klasse.

Einblat. Weiße Leberblume.

Linne Pf. S. 6 Th. S. 229.

- a. Die 5theilige Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone, in der-  
selben die 5 Staubfäden und  
die 5 schönen Honigbehältnisse
- c. Ein abgesonderter Staub-  
faden.
- d. Ein Honigbehältniß.
- e. Der Fruchtknoten mit den 4  
Narben ohne Griffel.

## Tab. 122.

Centaurea benedicta. Cl. XIX.

Centaurea calycibus duplicato  
spinosis lanatis involucriatis,  
foliis semidecurrentibus den-  
ticulato spinosis. L. 655.Carduus benedictus s. sanctus.  
Cnicus sylvestris hirsutior.

a. Calyx communis.

b. eius folium cum aculeis.

c. Corolla composita.

d. Corollula hermaphrodita ore  
5 fido.

e. eius stamina 5 coalita.

f. Germen separatum, cum sty-  
lo filiformi et stigmate.

g. Semen cum pappo.

h. Flos femineus, cum germine  
minimo.Colitur apud nos in hortis,  
altitudine 2-3 pedali, valde ra-  
mosa est et Augusto floret.

## Tab. 123.

Parnassia palustris. Cl. V.

Parnassia palustris. L. 247.

Gramen parnassi. Hepatica alba.

a. Perianthium 5 partitum.

b. Corolla pentapetala, in illa  
stamina 5, et nectaria 5 pul-  
cherrima.

c. Stamen separatum.

d. Nectarium separatum.

e. Germen absque stylo, cum  
stigmatibus 4.

Crescit







*Parnassia palustris.* L.



*Sempervivum*  
*tectorum. L.*









*Aristolochia rotunda* . L.



*Ophioglossum vulgatum*. L.





Wächst auf nassen Wiesen, wird selten 1 Fuß hoch, blüht im August.

Crescit in pratis humidis, raro altitudinem pedis unius attingit, floret Augusto.

### 124. Tafel.

Dugblume. Pl. G. 665. 11 Klasse.  
Hanslauch. Hauswurz.  
Linne Pl. S. 7 Th. S. 91.

- a. Die 12blättrige Blumendecke mit den Fruchtknoten.
  - α. Ein Blatt von derselben.
  - b. Die 12blättrige Krone, in derselben 24 Staubfäden.
  - c. Ein Kronblatt mit 2 daran hangenden Staubfäden.
  - d. Ein abgesonderter Staubfaden.
  - e. Die 12 Fruchtknoten.
- Wächst auf Dächern, Mauern &c. Der Blumenstengel wird in gutem Boden gegen 3 Fuß hoch, blüht im August.

### 125. Tafel.

Osterluzey. Pl. G. 1105. 20 Klasse.  
Runde Hohlwurz. Runde Osterluzey.  
Linne Pl. S. Th. S.

- a. Die einblättrige röhrigte Krone.
- b. Eben diese geöffnet.
- c. Die 6 Staubbeutel unter der Narbe angewachsen.
- d. Der Fruchtknoten mit der runden 6theiligen Narbe.
- e. Eben dieser entzweigesehnitten.
- f. Die Narbe mit den 6 Staubbeuteln von oben.
- g. Ein abgesonderter Staubbeutel.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst ohngefähr 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im August.

### Tab. 124.

Sempervivum tectorum. Cl. XI.  
Sempervivum foliis ciliatis, pro-  
paginibus patentibus. L. 378.  
Sedum maius vulgare.

- a. Perianthium 12 partitum cum germinibus.
- α. eius folium.
- b. Corolla petalis 12, cum 24 staminibus.
- c. Petalum cum 2 staminibus adhaerentibus.
- d. Stamen separatum.
- e. Germina 12.

Crescit in tectis, muris praeruptis &c. Caulis florifer in fertili humo cultus altitudinem 3 pedum attingit, floret Augusto.

### Tab. 125.

Aristolochia rotunda. Cl. XX.  
Aristolochia foliis cordatis subsessilibus obtusis, caule infirmo, floribus solitariis. L. 687.

- a. Corolla monopetala tubulosa.
- b. eadem aperta.
- c. Antherae 6, subtus stigmatibus adnatae.
- d. Germen cum stigmate subgloboso sexpartito.
- e. idem dissectum.
- f. Stigma cum antheris 6, a parte superiore.
- g. Anthera separata.

Colitur apud nos in hortis, altitudine circiter sesquipedali, floret Augusto.

Tab.



## 126. Tafel.

Natterzunge. Pl. G. 1281. 24

Klasse.

Linne Pfl. C. 12 Th. C.

Wächst in feuchten schattigen Orten in Wäldern, wird 1 halben Fuß hoch, findet sich im Mai und Junius.

## 127. Tafel.

Umpfer. Pl. G. 483. 6 Klasse.

Rothblättrige Grindwurz.

Linne Pfl. C. 6 Th. C. 367.

- a. Die 3blättrige Blumendecke.
- b. Die 3blättrige Krone mit den 6 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter 2theiliger Staubfaden.
- d. Der kreiselförmige Fruchtknoten mit den 3 zurückgeschlagenen Griffeln, und den zerstückten Narben.
- e. Das harte am Kronblatt angewachsene Kröngen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst mit sehr vielen Seitenästen 3-4 Fuß hoch, blüht im August.

## 128. Tafel.

Hibernell. Pl. G. 394. 5 Klasse.

Anis.

Linne Pfl. C. 6 Th. C. 203.

- a, Die allgemeine Dölde.
- b. b. b. Die besonderen Dölden.
- c. Die besondere 3blättrige Krone.

## Tab. 126.

Ophioglossum vulgatum. Cl. XXIV.

Ophioglossum fronde ovata. L. 779.

Echioglossum. Lingua serpentaria.

Crescit in locis humidis umbrosis sylvarum, altitudine semipedali, Maio vel Iunio invenitur.

## Tab. 127.

Rumex sanguineus. Cl. VI.

Rumex floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis unica granisera, foliis cordato lanceolatis. L. 284.

Lapathum sanguineum.

a. Perianthium triphyllum.

b. Corolla tripetala, cum staminibus 6.

c. Stamen separatum anthera didyma.

d. Germin turbinato triquetrum, cum stylis 3 reflexis, et stigmatibus laciniatis.

e. Granum durum petalo adnatum.

Crescit apud nos in hortis, ramosissimus est, altitudine 2-3 pedum, floret augusto.

## Tab. 128.

Pimpinella anisum. Cl. V.

Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis. L. 241.

Apium Anisum dictum.

a. Umbella universalis.

b. b. b. Umbellae partiales.

c. Corolla propria pentapetala.

d. eadem





*Rumex Sanguineus. L.*





*Pimpinella anisum*. L.







*Cornus mascula*. L.





*Carduus marianus* . L.



- d. Eben diese von oben, mit den 5 Staubfäden.  
 e. Ein Kronblatt, mit den daran hängenden Staubfäden.  
 f. Der Fruchtknoten mit den 2 Griffeln und den 2 runden Narben.  
 g. Saamen in 2 Stücke theilbar.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst bis 2 Fuß hoch, blüht im August.

- d. eadem à parte superiore, cum staminibus.  
 e. Petalum, cum stamine annexo.  
 f. Germen cum stylis 2, et stigmatibus 2 globosis.  
 g. Semen in 2 partes divisibilis.

Colitur in hortis nostris, altitudine bipedali, augusto floret.

## 129. Tafel.


Gärten. M. G. 156. 4 Klasse. Kornelkirschen. Ruhrkirschen. Dürlichen.  
 Linne Pl. S. 1. Th. S. 238.

- a. a. Die 4blättrige Hülle, mit vielen Blümcgen, die Blättgen hohl eingebogen.  
 b. Die kleine 4zählige Blumendecke.  
 c. Die 4blättrige Krone, die Blättgen sind zurückgeschlagen.  
 d. Die 4 Staubfäden etwas einwärts gebogen, nicht gar so lang als die Kronblättgen.  
 e. Ein abgesonderter Staubfaden.  
 f. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der Narbe.  
 g. Zeitige Früchte.  
 h. Eine solche von innen.  
 i. Die Nuß 2fächerig.  
 k. Diese die Quere durchschnitten.  
 l. Kerne.

## Tab. 129.

Cornus mascula. Cl. IV.  
 Cornus arborea, umbellis involucrum aequantibus. L. 134.  
 Cornus hortensis.

- a. a. Involucrum tetraphyllum multiflorum foliolis incurvatis.  
 b. Perianthium minimum quadridentatum.  
 c. Corolla tetrapetala, petalis reflexis.  
 d. Stamina 4 incumbentia petalis paulo brevioribus.  
 e. Stamen separatum.  
 f. Germen cum stylo et stigmate.  
 g. Drupae maturae.  
 h. Talis ab interna parte.  
 i. Nux bilocularis.  
 k. Eadem transversim dissecta.  
 l. Nuclei.



Wächst in Sonnenreichen Wäldern, an Gehegen und in Gärten, erreicht eine ziemliche Baumböhe. Blüht im April und Mai.

Crescit in sylvis apricis, ad fepes, altitudinem mediam arboris attingit, floret aprili et majo.

## 130. Tafel.

Distel. Pl. G. 998. 19 Klasse.  
Mariendistel. Bebedistel.  
Linne Pl. S. 9 Th. S. 163.

- a. Der gemeinschaftliche, schuppigte stachelichte Kelch.
- b. Die zusammengesetzte Krone.
- c. Ein besonderes Zwitterkrönchen.
- d. Eben dieses geöffnet.
- e. Die 5 zusammenhängende Staubfäden, so den Griffel umgeben.
- f. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der ausgeschnittenen Narbe.
- g. Der Saame mit der Krone.

Wächst in vielen Gärten und angebauten Orten wild, wird 6—7 Fuß hoch, blüht im August.

## Tab. 130.

*Carduus marianus*. Cl. XIX.

*Carduus foliis amplexi caulibus hastatopinnatifidis spinosis, calicibus aphyllis, spinis canaliculatis duplicato spinosis.*  
L. 605.

*Carduus mariae*. v. *Lacteus*.

*Spina alba*.

- a. Calyx communis, imbricatus spinosus.
- b. Corolla composita.
- c. Corollula propria hermaphrodita.
- d. Eadem aperta.
- e. Stamina 5 coalita, stylum cingentia.
- f. Germen cum stylo filiformi et stigmate emarginato.
- g. Germen cum pappo.

Sponte crescit in multis hortis et locis agrestibus, altitudine 6—7 pedum, floret Augusto.

Tab.










*Ononis arvensis. L.*







## 131. Tafel.

## Tab. 131.

Wunderbaum. Pl. G. 1180.  
21 Klasse.

Linne Pl. S. 4. Th. S. 543.

- a. Männliche Blumen.
- b. Die einblättrige 5theilige Blumendecke derselben.
- c. Einer der zahlreichen ästigen Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter, mit dem zknöspfigen Staubbeutel, welcher
- e. nach der Zeitigung aufspringt.
- f. f. Weibliche Blumen.
- g. Die einblättrige 3theilige Blumendecke.
- h. Der Fruchtknoten, mit den 5borstigen Griffeln und den 2theiligen Narben.
- i. Die stachelichte entzweigte schnittene Saamentapsel.
- k. Saamen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, erreicht eine Höhe von 7–8 Fuß, blüht im Julius und August.

*Ricinus communis*. Cl. XXI.

*Ricinus foliis peltatis subpalmaris*. L. 723.

*Cataputia major*.

- a. Flores masculi.
- b. *Perianthium ejus monophyllum 5 partitum*.
- c. *Unus staminorum numerosorum ramosorum*.
- d. *Stamen separatum cum anthera didyma, quae*
- e. *post maturitatem desilit*.
- f. f. Flores foeminei.
- g. *Perianthium monophyllum tripartitum*.
- h. *Germen cum stylis 3 hispidis et stigmatibus bipartitis*.
- i. *Capsula aculeata dissecta*.
- k. Semen.

Colitur apud nos in hortis, altitudinem 7–8 pedum attingit, Julio et Augusto floret.

## 132. Tafel.

## Tab. 132.

Haubechel. Pl. G. 933. 17 Klasse.

Stallkraut. Ochsenbrechwurzel.

Linne Pl. S. 8 Th. S. 510.

*Ononis arvensis*. Cl. XVII.

*Ononis floribus racemosis, foliis ternatis, superioribus foliariis, ramis inermibus subvillofis*. L. 541.

*Restia bovis*.

2

2. Pe-



- a. Die einblättrige 5theilige Blumendecke.
- b. Die schmetterlingsförmige Krone.
- c. Die Fahne derselben.
- d. d. Die beiden Flügel.
- e. e. Das Schiffgen.
- f. Die 10 verwachsene Staubfäden.
- g. Der Stempel.

Wächst auf dürrn Heiden, an trocknen Wegen, wird bei 2 Fuß hoch, blüht im August.

Im ersten Jahr hat die Pflanze keine Stacheln.

- a. Perianthium monophyllum 5 partitum.
- b. Corolla papilionacea.
- c. Ejus vexillum.
- d. d. Alaeduae.
- e. e. Carina.
- f. Stamina 10, connata.
- g. Pistillum.

Crescit in solo rupestri, altitudine bipedali, floret Augusto.

Anno primo planta inermis est.

### 133. Tafel.

Zeitlosen. Pl. G. 490. 6 Klasse.  
Herbstblumen. Spinnblumen.  
Wilder Safran. Hundsho-  
den.  
Linne Pf. S. 11 Th. S.

- a. Die Scheide.
- b. Die 6theilige Krone, in derselben die 6 Staubfäden, sie kommt im Herbst hervor.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt mit einem Staubfaden.
- d. Die 3 Griffel mit den zurückgeschlagenen Narben, sie

### Tab. 133.

Colchicum autumnale. Cl. VI.  
Colchicum foliis planis lanceo-  
latis erectis. L. 287.  
Colchicum commune.

- a. Spatha.
- b. Corolla sexpartita, in ea stamina 6, provenit autumnos.
- c. Petalum separatum cum stamine.
- d. Styli 3 cum stigmatibus reflexis totam longitudinem tu-  
bj





*Colchicum autumnale* L.





*Melissa officinalis*. L.



gehen durch die ganze Höhe der Krone, und endigen sich in den Fruchtknoten, der in der Zwiebel

e. verborgen liegt.

f. Die Frucht, sie erscheint nebst den Blättern, im Frühjahr.

g. Eben diese entzweigeschnitten.

Wächst auf nassen Wiesen 5—6 Zoll hoch, blüht im September, zuweilen auch im Frühjahr.

bi transeunt, desinunt in gemen sepultum

e. intra radicem.

f. Capsula seminalis, simul cum foliis vere proveniens.

g. Eadem dissecta.

Crescit in pratis humidis, altitudine 5—6 policum, floret septembre, interdum etiam vere.

### 134. Tafel.

Melisse. Pl. G. 784. 14 Klasse.

Citron-Melisse. Bienenkraut. Herzkraut.

Linne Pfl. S. 7 Th. S. 537.

a. Die einblättrige zlippigte Blumendecke.

b. Die einblättrige rachenförmige Krone, geöffnet mit den 4 Staubfäden, deren 2 fast die Hälfte länger sind als die andern.

c. Ein abgesonderter Staubfaden.

d. Der 4spaltige Fruchtknoten, mit dem fadenförmigen Griffel und der 2spaltigen Narbe.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst über 3 Fuß hoch mit

### Tab. 134.

Melissa officinalis. Cl. XIV.

Melissa racemis axillaribus verticillatis, pedicellis simplicibus, L. 453.

Citronella.

a. Perianthium monophyllum, bilabiatum.

b. Corolla monopetala ringens, aperta, cum staminibus 4, quorum 2 dimidio breviora.

c. Stamen separatum.

d. Germen quadrisidum cum stylo filiformi et stigmate bifido.

Colitur apud nos in hortis, altitudinem 3 pedum superat, 2 3



mit vielen Seitenästen, blüht  
im August.

perat, valde ramosa est, augus-  
to floret.

### 135. Tafel.

Ellend. Pl. G. 352. 5 Klasse.  
Mansreu. Radendistel.  
Brachendistel: Krausdistel.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 8.

- a. Die Hülle des Bodens.
- b. Die 5blättrige Blumenbedeckung  
auf dem Fruchtknoten sitzend.
- c. Ein Blat davon.
- d. Die besondere 5blättrige  
Krone mit den 5 Staubfäden.
- e. Ein abgesonderter Staubfaden.
- f. Der borstige Fruchtknoten  
mit den 2 Griffeln und den  
einfachen Narben.

Wächst an wilden steinigten  
Orten, wird öfters 3 Fuß hoch,  
blüht im August.

### Tab. 135.

*Eryngium campestre*. Cl. V.  
*Eryngium foliis radicalibus amplexicaulibus*. L. 224.  
*Lyringium. Acus veneris*.

- a. Involucrum receptaculi.
- b. Perianthium pentaphyllum  
germini insidens.
- c. Folium eius separatum.
- d. Corolla pentapetale propria  
cum staminibus 5.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen hispidum cum stylis  
2 et stigmatibus simplicibus.

Crescit in locis lapidosis defertis, altitudine soepius 3 pedali, floret augusto.

### 136. Tafel.

Seifenkraut. Pl. G. 611. 10  
Klasse.  
Roths Seifenwurz. Wilder  
Wald.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 552.

### Tab. 136.

*Saponaria officinalis*. Cl. X.  
*Saponaria calycibus cylindricis, foliis ovato lanceolatis*. L. 347.  
*Lychnis sylvestris quae saponaria vulgo*.

a. Pe-







*Eryngium campestre*. L.



*Saponaria officinalis*. L.












*Lichen Islandicus. L.*







- |   |  |
|---|--|
| a. Die aufgeschnittene einblättrige 5zählige Blumendecke. | a. Perianthium monophyllum quinquedentatum, apertum. |
| b. Die 5blättrige Krone.                                  | b. Corolla pentapetala.                              |
| c. Ein Kronblatt mit dem langen Nagel.                    | c. Pentalum cum ungue longissimo.                    |
| d. Die 10 Staubfäden.                                     | d. Stamina decem.                                    |
| e. Ein abgesonderter.                                     | e. Stamen separatum.                                 |
| f. Der lange Fruchtknoten mit den 2 Griffeln.             | f. Germen teretiusculum cum stylis 2.                |
| g. Die Saamentapsel.                                      | g. Capsula seminalis.                                |
| h. Die Saamen.  | h. Semina.   |

Wächst an Wegen und nicht gar zu trockenen Orten, wird bei 2 Fuß hoch, blüht im Julius oder August.

Crescit ad vias et in locis humidiusculis, altitudine bipedali, floret Julio et Augusto.

## 137. Tafel.

Weinweil. Pl. G. 195. 5 Klasse.  
Schwarzwurz. Wallwurz.  
Schneerwurz. Weinwurz.  
Linne Pl. C. 5 Th. C. 431.

- a. Die 5theilige Blumendecke.
- b. Die einblättrige, glockenförmige Krone geöffnet, mit den 5 darinnen sitzenden Spizen und den dazwischen stehenden 5 Staubfäden.
- c. Die 5 Spizen wie sie in der Krone stehen.
- d. Eine derselben abgesondert.

## Tab. 137.

Symphitum officinale. Cl. V.  
Symphitum foliis ovato lanceolatis decurrentibus. L. 158.  
Consolida major.

- a. Perianthium quinquepartitum.
- b. Corolla monopetala, campanulata, aperta, cum radiis 5 ei insertis, et staminibus 5 interpositis.
- c. Radii 5 in situ naturali.
- d. Radius separatus.

c. Sta.



- e. Ein abgesonderter Staubfa-  
den.  
f. Die 4 Fruchtknoten mit dem  
langen Griffel und der kaum  
merklichen Narbe.

e. Stamen separatum.

f. Germina 4 cum stylo longo  
et stigmate vix notabili.

Wächst an Bächen, wird  
über 2 Fuß hoch, blüht im  
Julius.

Crescit ad rivulos altitudine  
supra bipedali, floret Julio.

### 138. Tafel.

Flechte. Pl. G. 1312. 24 Klasse.  
Isländisches Moos.  
Linne Pl. S. 12 Th. S.

Wächst in verschiedenen  
Fältern Gegenden von Deutsch-  
land, auf den Bergen und in  
deren Wäldern, z. E. häufig  
auf dem Mtfingerberge, ohne  
weit Frankfurt.

### Tab. 138.

Lichen Islandicus. Cl. XXIV.  
Lichen foliaceus adscendens la-  
ciniatus, marginibus elevatis  
ciliatis. L. 807.  
Muscus Islandicus. v. Catharti-  
cus.

Crescit in montibus et earum  
sylvis diversarum regionum fri-  
gidiorum, germaniae, e. g. abun-  
de in monte Altking prope Fran-  
cofurtum. Confer. Reichardi  
flor. Francofurtensem.

### 139. Tafel.

Metter. Pl. G. 1043. 19 Klasse.  
Chamillen. Kommen.  
Linne Pl. S. 9 Th. S. 488.

a. Der gemeinschaftliche gleich-  
förmige Kelch,

### Tab. 139.

Matricaria chamomilla. Cl. XIX.  
Matricaria receptaculis conicis,  
radiis patentibus, squamis ca-  
lycinis margine aequalibus.  
L. 643.

Chamomilla Vulgaris. Chamae-  
melum.

a. Calyx communis aequalis.

b. Co-






*Matricaria chamomilla*. L.





*Carthamus tinctorius*. L.






- |  |   |
|--|---|
| b. Die zusammengesetzte gestrahlte Krone.                      | b. Corolla composita radiata.           |
| c. Daß besondere 5spaltige Zwitterkröngen.                     | c. Corollula propria hermaphrodita.     |
| d. Die in demselben befindliche 5 zusammenhängende Staubfäden. | d. Ejus stamina 5 coalita.              |
| e. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.  | e. Germen cum stylo et stigmate bifido. |
| f. Ein weibliches Kröngen.                                     | f. Corollula foeminea.                  |
| g. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und den 2 Narben.          | g. Germen cum stylo et 2 stigmatibus.   |

Wächst auf Aeckern und Wiesen, wird bei 2 Fuß hoch, blüht im Julius und August.

Crescit in agris et pratis, altitudine circiter bipedali, floret Julio et Augusto.



### 140. Tafel.

### Tab. 140.

Saflor. Pl. G. 1004. 19 Klasse.  
Wilder Safran.  
Linne Pf. S. 9 Th. S. 205.

Carthamus tinctorius. Cl. XIX.  
Carthamus foliis ovatis integris  
Serrato aculeatis, L. 609.  
Cnicus Sativus.

- |  |   |
|--|---|
| a. Der gemeinschaftliche Kelch.  | a. Calyx communis.                                  |
| b. Die zusammengesetzte Krone.   | b. Corolla composita.                               |
| c. Daß besondere einblättrige, 5theilige Kröngen.                          | c. Corollula propria monopetala quinquepartita.     |
| d. Die verwachsene Staubfäden.   | d. Stamina coalita.                                 |
| e. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der einfachen Narbe. | e. Germen cum stylo filiformi et stigmate simplici. |



Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst bei 3 Fuß hoch, blüht im August.

Colitur apud nos in hortis altitudine circiter 3 pedali, floret Augusto.

### 141. Tafel.

Spirerstaude. Pl. G. 685. 12 Klasse.  
Geißbart. Johannismedel.  
Linne Pfl. S. 7 Th. S. 135.

- a. Die einblättrige halb 5spaltige Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone, mit den vielen im Kelch eingefügten Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Die 5 Fruchtknoten mit den Griffeln und knöpfigen Narben.
- e. Ein abgesonderter davon.
- f. Die gedrehten Saamentkapfeln.

Wächst an nassen Orten, an Gehegen &c. wird über 3 Fuß hoch, blüht im Julius.

### Tab. 141.

*Spiraea ulmaria*. Cl. XII.

*Spiraea foliis pinnatis, impari majore lobato, floribus cymosis*. L. 393.  
*Barba caprae*. *Regina pratorum*.

- a. Perianthium monophyllum semiquinquefidum.
- b. Corolla pentapetala cum staminibus numerosis calyci infertis.
- c. Stamen separatum.
- d. Germina 5, cum stylis et stigmatibus capitatis.
- e. Germen separatum.
- f. Capsulae feminales contortae.

Crescit in locis humidis, ad sepes &c. altitudinem 3 pedum superat, floret Julio.

### 142. Tafel.

Scabiose. Pl. G. 120. 4 Klasse.  
Apostemkraut. Schwarzkraut.  
Linne Pfl. S. 5 Th. S. 234.

### Tab. 142.

*Scabiosa arvensis*. Cl. IV.  
*Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, foliis pinnatifidis incisis, caule hispido*. L. 121.

a. Flos







*Spiræa Ulmaria* . L.



*Scabiosa arvensis* L.









*Betonica officinalis*. L.



*Sisymbrium*

*nasturtium* L.







- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Die umgekehrte Blume, um die vielblättrige allgemeine Blumendecke zu sehen.</p> <p>b. Die gedoppelte besondere Blumendecke.</p> <p>c. Die allgemeine Krone.</p> <p>d. Ein besonderes Kröngen, 4spaltig ungleich.</p> <p>e. Eben dieses geöffnet, mit den 4 Staubfäden.</p> <p>f. Ein abgesonderter Staubfaden.</p> <p>g. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der stumpfen Narbe.</p> <p>h. Ein Grundblatt.</p> | <p>a. Flos perversa facie ut perianthium commune polyphyllum in conspectum veniat.</p> <p>b. Perianthium proprium duplex.</p> <p>c. Corolla universalis.</p> <p>d. Corollula propria quatuorfidata inaequalis.</p> <p>e. Eadem aperta cum staminibus 4.</p> <p>f. Stamen separatum.</p> <p>g. Germen cum stylo et stigmate obtuso.</p> <p>h. Folium radicale.</p> |
|---|---|

Wächst auf Wiesen, ohngefähr  $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, blüht im Junius und Julius.

Crescit in pratis, altitudine circiter sesquipedali, floret Junio et Julio.

Bei vielen Pflanzen sind die Blätter etwas mehr gesiedert.

Inveniuntur plantae quorum folia magis pinnata sunt.

### 143. Tafel.

### Tab. 143.

Betonie. Pl. G. 774. 14 Klasse.  
Zehrtraut. Pfaffenblümlein.  
Linne Pf. S. 7 Th. S. 468.


Betonica officinalis. Cl. XIV.

Betonica spica interrupta, corollae labia lacinia intermedia emarginata. L. 446.

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Die einblättrige 5zählige Blumendecke.</p> <p>b. Die einblättrige rachenförmige Krone, mit den 2 langen und 2 kurzen Staubfäden.</p> | <p>a. Perianthium monophyllum 5dentatum.</p> <p>b. Corolla monopetala ringens, cum staminibus 2 longioribus, 2 brevioribus.</p> |
|--|---|

M 2

c. Sta-



- c. Ein abgesonderter Staubfaden.  
d. Der 4theilige Fruchtknoten, mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.

c. Stamen separatum.

- d. Germen 4 dripartitum cum stylo et stigmate bifido.

Wächst auf Wiesen an Bächen u. wird ohngefahr 1 Fuß hoch, blüht im Julius.

Crescit in pratis, ad sylvas &c. altitudine circiter pedali, floret Julio.

### 144. Tafel.

### Tab. 144.

Rauken. Pl. G. 875. 15 Klasse.  
Brunnenkresse. Wasserkresse.  
Linne Pf. S. 8 Th. S. 283.

*Sisymbrium nasturtium*. Cl. XV.  
*Sisymbrium filiquis declinatis*,  
foliis pinnatis, foliolis subcordatis. L. 497.

*Nasturtium aquaticum*.

- a. Die 4blättrige gefärbte Blumendecke.  
b. Die 4blättrige kreuzförmige Blume.  
c. Die 6 Staubfäden, deren 4 länger, 2 kürzer sind.  
d. Ein abgesondertes Kronblatt mit dem Nagel.  
e. Die eingekrümmte Schote.  
f. Diese geöffnet, mit dem Samen.

- a. Perianthium tetraphyllum coloratum.  
b. Corolla tetrapetala cruciformis.  
c. Stamina 6, quorum 4 longiora, 2 breviora sunt.  
d. Petalum separatum cum ungue.  
e. Siliqua incurva.  
f. Eadem aperta cum seminibus.

Wächst in Bächen, wird über 2 Fuß hoch, blüht im Julius und August.

Crescit in rivulis, longitudine bipedali, floret Julio et Augusto.

### 145. Tafel.

### Tab. 145.

Gauchheil. Pl. G. 217. 5 Klasse.

*Anagallis arvensis*. Cl. V.

Ana-





*Anagallis arvensis*. L.





*Cicer arietinum. L.*





Rothe Myre. Kollmartraut.  
Vogelkraut. Hünerdarm.  
Linne Pfl. S. 5 Th. S. 496.

Anagallis foliis indivisis, caule  
procumbente. L. 165.  
Anagallis phoeniceo flore.

- a. Die 5theilige spitzige Blumendecke mit dem Stempel.
- b. Die einblättrige, radförmige 5theilige Krone mit den 5 Staubfaden.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt mit dem darauf sitzenden Staubfaden.
- d. Die runde Saamentkapsel.

- a. Perianthium 5 partitum acutum, cum pistillis.
- b. Corolla monopetala, rotata, 5 partita, cum 5 staminibus.
- c. Petalum separatum cum stamine ei inserto.
- d. Capsula seminalis rotunda.

Wächst auf Hecken, wird kaum  $\frac{1}{2}$  Fuß hoch, liegt auf dem Boden wegen der Schwärze des Stieles, blüht im Julius und August.

Crescit in agris, vix altitudine semipedali, planta propter debilitatem caulis incumbit humo, floret Julio et Augusto.

## 146. Tafel.

Riser. Pl. G. 947. 17 Klasse.  
Rüchern. Rüchererbse.  
Linne Pfl. S. 8 Th. S. 629.

- a. Die 5spaltige grosse Blumendecke.
- b. Die schmetterlingsförmige Krone.
- c. Die Fahne derselben.
- d. Die Flügel.
- e. Das Schifgen.
- f. Die 10 Staubfaden in 2 Parthien verwachsen.
- g. Die 9 zusammenhängende Staubfaden.
- h. Der einzelne besondere.

## Tab. 146.

Cicer arietinum. Cl. XVII.  
Cicer foliolis ferratis. L. 554.  
Cicer sativum flore candido.

- a. Perianthium magnum 5 partitum.
- b. Corolla papilionaea.
- c. Ejus vexillum.
- d. Alae.
- e. Carina.
- f. Stamina 10, diadelpa.
- g. Stamina 9 coalita.
- h. Stamen unicum separatum.



- i. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der stumpfen Narbe.  
 k. Die Hülse.  
 l. Saamen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst über 3 Fuß hoch, blüht im Julius.

- i. Germen cum stylo et stigmate obtuso.  
 k. Legumen.  
 l. Semen.

Colitur apud nos in hortis, altitudinem 3 pedalem attingit, floret Julio.

## 147. Tafel.

Boretisch. Pl. G. 198. 5 Klasse.  
 Boragen.  
 Linne Pf. C. 5 Th. C. 438.

- a. Die 5theilige Blumendecke.  
 b. Die einblättrige, radförmige, 5theilige Krone, mit den 5 Staubfäden.  
 c. Ein Staubfaden, mit dem daran hängenden Ansatz und Kronblatt.  
 d. Ein abgesonderter Staubfaden.  
 e. Die 4 Fruchtknoten, mit dem fadenförmigen Griffel und der runden Narbe.  
 f. Saamen.

Wird in Gärten gefunden, wo es sich stets als Unkraut selbst fortpflanzt, wächst bei 2 Fuß hoch, blüht im August.

## Tab. 147.

*Borago officinalis*. Cl. V.  
*Borago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus*. L.  
 159.

- a. Perianthium 5 partitum.  
 b. Corolla monopetala, rotata, 5 partita, cum staminibus 5.  
 c. Stamen num prominentia adhaerente et petalo.  
 d. Stamen separatum.  
 e. Germina 4, cum stylo filiformi et stigmate rotundo.  
 f. Semen.

Invenitur in hortis, sponte propagatur, crescit altitudine bipedali, floret Augusto.

## 148. Tafel.

Conchen. Pl. G. 981. 19 Klasse.

## Tab. 148.

*Sonchus oleraceus (laevis)*. Cl. XIX.

Son-







*Borago officinalis* . L.



*Sonchus oleraceus.* (Lævis) L.







*Echium vulgare*. L.





*Scabiosa Succisa*. L.





Häsefobl. Gänsefistel.  
Linne Pl. S. 9 Th. S. 25.

*Sonchus pedunculis tomentosus,*  
*calycibus glabris. L. 594.*

*Sonchus laevis laciniatus latifolius.*

- a. Der gemeinschaftliche bucklichte Kelch.
- b. Die zusammengesezte Krone.
- c. Das besondere Zwitterkrön gen.
- d. Eben dieses ohne den Saamen.
- e. Die 5 zusammenhängenden Staubfäden.
- f. Der Fruchtknoten mit dem langen Griffel und den 2 Narben.
- g. Saame mit der haarigten Saamentrone.

- a. Calyx communis ventricosus.
- b. Corolla composita.
- c. Corollula propria hermaphrodita.
- d. Eadem absque semine.
- e. Stamina 5 coalita.
- f. Germen cum stylo longo, et 2 stigmatibus.
- g. Semen cum pappo piloso.

Wächst in Gärten, an Häusern ic. wird ohngefähr 2 Fuß hoch, blüht alle 3 Sommermonate.

Crescit in hortis, ad aedes &c. altitudine circiter bipedali, floret per totam aestatem.

## 149. Tafel.

Matterkopf. Pl. G. 201. 5 Klasse.  
Wilde Ochsenzunge.

Linne Pl. S. 5 Th. S. 451.

- a. Die 5theilige Blumenbedeck.
- b. Die einblättrige, glockenförmige 5spaltige Krone.
- c. Eben diese geöffnet, mit den 5 Staubfäden.

## Tab. 149.

*Echium vulgare. Cl. V.*

*Echium caule taberculato hispidum, foliis caulinis lanceolatis hispidis, floribus spicatis lateralibus. L. 160.*

*Viperina.*

- a. Perianthium 5 partitum.
- b. Corolla monopetala, campanulata, 5 fida.
- c. Eadem aperta cum staminibus 5.

d. Sta-



- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Die 4 Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der 2spaltigen Narbe.
- f. Saamen.

Wächst an wilden steinigten Orten, an Wegen, wird ohngefähr 2 Fuß hoch, mit vielen Seitenästen, blüht im August.

d. Stamen separatum.

e. Germina 4, cum stylo filiformi et stigmate bifido.

f. Semen.

Crescit in locis ruderalibus &c. altitudine circiter bipedali, valde ramosa est et Augusto floret.

### 150. Tafel.

Scabiose. Pl. G. 120. 5 Klasse.  
Teufels Abbis.  
Linne Pl. S. 5 Th. S. 230.

- a. Die umgekehrte Blume um die gemeinschaftliche vielblättrichte Blumendecke zu sehen.
- b. Die besondere Blumendecke.
- c. Die allgemeine Krone.
- d. Das besondere einblättrige halb 5spaltige Krönchen.
- e. Eben dieses aufgeschnitten, mit den 4 Staubfäden.
- f. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der schiefen Narbe.

Wächst in nassen Wiesen, wird bei  $1\frac{1}{2}$  Fuß hoch, blüht im August.

### Tab. 150.

Scabiosa succisa. Cl. IV.  
Scabiosa corollulis quadrifidis aequalibus, caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato ovatis. L. 121.  
Morsus diaboli.

- a. Flos perversa facie ut perianthium commune polyphyllum adpareat.
- b. Perianthium proprium.
- c. Corolla universalis.
- d. Corollula propria monopetala semiquinquesida.
- e. Eadem aperta cum staminibus 4.
- f. Germen cum stylo et stigmate obliquo.

Crescit in pratis humidis, altitudine sesquipedali, floret Augusto.







*Crocus sativus*. L.



*Sinapis nigra*. L.



## 151. Tafel.

Safran. Pl. G. 61. 3 Klasse.

Linne Pf. S. 11 Th. S.

- a. Die einblättrige Scheide.
- b. Die röhrigte 6theilige Krone.
- c. Ein Kronblatt mit den Staubfäden, deren 3 ähnliche in der Blume sind.
- d. Die Griffel mit den 3 Narben, welcher der eigentliche Safran ist.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst in der abgebildeten Größe, blüht im September.

## Tab. 151.

Crocus sativus. Cl. III.

Crocus Spatha univalvi radicali, corolla tubo longissimo. L. 75. 1.

Crocus officinalis, autumnalis, foliis angustioribus margine revolutis.

- a. Spatha monophylla.
- b. Corolla tubulata, limbo sexpartito.
- c. Petalum cum stamine quorum tria similia in flore sunt.
- d. Stylus cum 3 stigmatibus, crocus proprie sic dictus.

Colitur in nostris hortis, magnitudine iconis, floret Septembre.

## 132. Tafel.

Senf. Pl. G. 883. 15 Klasse.

Linne Pf. S. 8 Th. S. 353.

- a. a. Die 4blättrige abstehende Blumendecke.
- b. Die 4blättrige Krone.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt mit dem Nagel.
- d. Die 6 Staubfäden, deren 2 kürzer sind.
- e. Ein abgesonderter Staubfaden.
- f. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der knöspigten Narbe, unten an diesem die 4 Honigdrüsen.
- g. Diese abgesondert.
- h. Die Schotte in die Länge.
- i. in die Quere durchschnitten.
- k. Samen.

## Tab. 152.


Sinapis nigra. Cl. XV.

Sinapis siliquis glabris racemo adpressis. L. 503. 3.

- a. a. Perianthium tetraphyllum patens.
- b. Corolla tetrapetala.
- c. Petalum separatum cum ungue.
- d. Stamina 6, quorum 2 breviora.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen cum stylo et stigmate capitato, cum glandulis 4 nectariferis inferis.
- g. Eaedem separatae.
- h. Siliqua longitudinaliter.
- i. transversim dissecta.
- k. Semen.

Coli-





Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst 4–5 Fuß hoch, sehr ästig, blüht im Julius.

### 153. Tafel.

Jasmin. Pl. G. 17. 2 Klasse.  
Linne Pfl. S. 3 Th. S. 8.

- a. Die einblättrige Blumendecke mit 5zähliger Mündung.
- b. Die einblättrige Krone mit 5theiliger Mündung, geöffnet, mit den 2 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der rundlichte Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der zweispaltigen Narbe.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst zu einer Staude von etlichen Fuß hoch, blüht im Julius und August.

### 154. Tafel.

Gentiane. Pl. G. 350. 5 Klasse.  
Tausendguldenkraut.  
Fieberkraut. Erdgallen.  
Linne Pfl. S. 5 Th. S. 860.

- a. Die 5theilige spitzige Blumendecke.
- b. Die trichterförmige Krone, mit 5theiliger Mündung, in derselben die 5 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der walzenförmige Fruchtknoten mit dem 2 Narben.
- e. Diese abgesondert.

Wächst auf Wiesen 7–8 Zoll hoch, blüht im Julius und August.

Colitur apud nos in hortis, altitudine 4–5 pedum, valde ramosa est, et Julio floret.

### Tab. 153.

Jasminum officinale. Cl. II.  
Jasminum foliis oppositis, foliolis distinctis. L. 54. I.

- a. Perianthium monophyllum ore quinquedentato.
- b. Corolla monopetala aperta, limbo quinquepartito, cum 2 staminibus.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen subrotundum cum stylo filiformi et stigmate bifido.

Colitur in hortis nostris, altitudinem fruticis nonnullorum pedum attingit, Julio et Augusto floret.

### Tab. 154.

Gentiana centaurium. Cl. V.  
Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, pistillo simplici. L. 222. 17.

- a. Perianthium quinquepartitum acutum.
- b. Corolla tubulata ore quinquefido, cum staminibus 5.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen cylindraceum cum duobus stigmatibus.
- e. Illa separata.

Crescit in pratis altitudine 7–8 pollicum, floret Julio et Augusto.

Tab.







*Jasminum officinale*. L.



*Gentiana centaurium* .L.










*Panax quinquefolium*. L.



*Prunella vulgaris* . L.





## 155. Tafel.

Kraftwurzel. Pl. G. 1274. 23  
Klasse.

Nordamerikanische Kraftwurzel.  
Linne W. S. 10 Th. S. 333.

- a. Die vielblättrige Hülle.
- b. Die 5blättrige Krone mit den 5 Staubfäden.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt, mit dem Fruchtknoten.
- d. Der Fruchtknoten mit den 2 Griffeln.
- e. Die 2fächerige unzeitige Beere, mit dem Nabel.
- f. Die zeitige Beere.
- g. Die Wurzel.
- h. Die 2 Saamen einer Beere.
- i. Eben diese von der Seite.

Es gibt auch Pflanzen mit bloß männlichen Blüthen. Sie wächst in China und Nordamerika. Statt dieser Kraftwurzel wird öfters und mehrers die Japanische Zuckermurzel, *Sium ninsi*, in den Apotheken gefunden.

## Tab. 155.

*Panax quinquefolium*, Cl. XXIII.  
*Panax foliis ternis, quinatis*. L.

773. 1.

*Ninsing radix*, Ginseng.

*Aureliana canadensis*.

- a. *Involucrum polyphyllum*.
- b. *Corolla pentapetala cum staminibus quinque*.
- c. *Petalum separatum cum germine*.
- d. *Germen cum duobus stigmatibus*.
- e. *Bacca immatura bilocularis cum umbilico*.
- f. *Bacca matura*.
- g. *Radix*.
- h. *Semina bina unius baccæ*.
- i. *eadem à latere*.

Dantur et plantae floribus solum masculis: Habitat in China et America septentrionali. Loco hujus panacis quinquefolii saepius et ut plurimum, radix illa Japanica, *Sium ninsi*, in pharmacopoliis invenitur.

## 156. Tafel.

Braunelle. Pl. G. 791. 14 Klasse.  
Gotthengl. St. Antonikraut.  
Prunellenkraut.

- a. Die einblättrige, 2lippige Blumendecke.
- b. Die einblättrige rachenförmige Krone, geöffnet, mit den 2 längern und 2 kürzern Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.

## Tab. 156.

*Prunella vulgaris*. Cl. XIV.


*Prunella foliis omnibus ovato-oblongis serratis petiolatis*.

L. 458. 1.

*Consolida minor*.

- a. *Perianthium monophyllum bilabiatum*.
- b. *Corolla monopetala ringens, aperta, cum 2 staminibus longioribus, 2 brevioribus*.
- c. *Stamen separatum*.





d. Der 4theilige Fruchtknoten, mit dem fadenförmigen Griffel und der gespaltenen Narbe.

Wächst auf Wiesen, wird selten 1 Fuß hoch, blüht im August.

### 157. Tafel.

Mohn. Pl. G. 702. 13 Klasse.  
Kornrosen. Klapperrosen.

Schnallenblumen.

Linne Pf. S. 7 Th. S. 198.

- a. Die 2blättrige Blumendecke.
- b. Die 4blättrige Krone.
- c. Ein Theil der zahlreichen Staubfäden.
- d. Der grosse Fruchtknoten, mit der schildförmigen gestrahlten Narbe.

Wächst in Kornfeldern, gegen 2 Fuß hoch, blüht im August.

### 158. Tafel.

Tasche. Pl. G. 864. 15 Klasse.

Taschelkraut. Hirtentasche.

Säckelkraut.

Linne Pf. S. 8 Th. S. 231.

- a. Die 4blättrige Blumendecke.
- b. Die 4blättrige kreuzförmige Blume.
- c. Ein Kronblatt mit dem Nagel.
- d. Die 6 Staubfäden, deren 2 kürzer als die 4 andern sind.
- e. Ein abgesonderter Staubfaden.
- f. Der Fruchtknoten mit der Narbe.
- g. Die Schotte.

d. Germen quadripartitum, cum stylo filiformi et stigmate bifido.

Crescit in pratis, raro pedalis, floret Augusto.

### Tab. 157.

Papaver rhoeas. Cl. XIII.

Papaver capsulis glabris globosis, caule piloso multifloro, foliis pinnatifidis incisis. L. 407. 6.

Papaver erraticum.

- a. Perianthium diphyllum.
- b. Corolla tetrapetala.
- c. Filamentorum numerosorum pars.
- d. Germen magnum, cum stigmate peltato radiato.

Crescit in agris bipedalis, floret Augusto.

### Tab. 158.

Thlaspi bursa pastoris. Cl. XV.

Thlaspi siliculis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis, L. 491. 10.

Herba cancri.

- a. Perianthium tetraphyllum.
- b. Corolla tetraphylla cruciformis.
- c. Petalum cum ungue.
- d. Stamina 6, quorum duo breviora 4 reliquis.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen cum stigmate.
- g. Siliqua.

Crescit







*Papaver rhoeas* . L.



*Thlaspi bursa pastoris*, L.










*Lycium afrum*, L.



*Senecio vulgaris*. L.





Wächst überall als Unkraut an Wegen und in Gärten, wird 2-3 Fuß hoch mit vielen Aesten, blüht den ganzen Sommer.

### 159. Tafel.

Buchsdorn. Pl. G. 279. 5 Klasse.  
Der Afrikanische Botsdorn.  
Linne Pl. S. 3 Th. S. 220.

- a. Die geöffnete, einblättrige, trichterförmige Krone, mit den 5 Staubfäden.
- b. Ein abgesonderter Staubfaden.
- c. Der Fruchtknoten mit dem Griffel und der 2spaltigen Narbe.
- d. Die Frucht ganz —
- e. entzweigesehritten.
- f. Die trockene Frucht.
- g. Der innere Knoten derselben, woran die Saamen hängen.
- h. Saamen in natürlicher Größe.
- i. vergrößert.

Wird in Gärten gezogen, hält aber strenge Kälte nicht aus. Die Staude wächst in Afrika, und Spanien wild, oft 10 und mehr Fuß hoch, blüht im August.

### 160. Tafel.

Brandspitzen. Pl. G. 1027. 19 Klasse.  
Kreuzkraut. Kreuzwurz. Goldkraut.  
Linne Pl. S. 9 Th. S. 348.

- a. Der gemeinschaftliche doppelte Kelch.
- b. Die zusammengesetzte Krone.
- c. Ein Zwitterkrögen mit der Saamentrone.

Crescit ubique cum mala herba ad vias ac in hortis, 2—3 pedali magnitudine valde ramosa, floret per totam aestatem.

### Tab. 159.

Lycium afrum, Cl. V.  
Lycium foliis linearibus. L. 190. 1.

Lycii Succus, Pharm. Wirt.

- a. Corolla monopetala, infundibuliformis, aperta, cum staminibus 5.
- b. Stamen separatum.

c. Germen cum stylo et stigmate bifido.

d. Bacca integra —

e. dissecta.

f. Bacca siccata.

g. Dissepimentum cum seminibus adhaerentibus.

h. Semen magnitudine natural.

i. magnitudine aucta.

Colitur in hortis, sed frigus rigidum non sustinet; sponte crescit in Africa et Hispania altitudine saepius 10 pedum, ac plurimum, floret Augusto.

### Tab. 160.

Senecio vulgaris. Cl. XIX.  
Senecio corollis nudis foliis pinato sinuatis amplexicaulibus, floribus sparsis. L. 630. 7.

a. Calix communis duplex.


b. Corolla composita.

c. Corollula hermaphrodita cum poppo.

N 3

d. ca





- d. Eben dieses geöfnet.  
 e. Die zusammenhängenden 5 Staubfäden aus demselben.  
 f. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und den 2 Narben.  
 g. Saamen mit der Krone.  
 Wächst überall als Unkraut in Gärten und Krautländern, wird 1 Fuß hoch, blüht den ganzen Sommer.

- d. eadem aperta.  
 e. Stamina 5 coalita ex ea.  
 f. Germen cum stylo filiformi et 2 stigmatibus.  
 g. Semen cum pappo.  
 Ubique crescit cum mala herba in hortis, et olitoriis, pedalis, toto aestate floret.

### 161. Tafel.

Camomille. Pl. G. 1047. 19 Klasse.  
 Römische edle Chamille.  
 Linne Pl. G. 9 Th. G. 507.

- a. Die umgekehrte Blume, um den gemeinschaftlichen Kelch zu sehen.  
 b. Die zusammengesetzte gestrahlte Krone.  
 c. Das besondere Zwitterkrönggen.  
 d. Eben dieses geöfnet.  
 e. Die 5 verwachsene Staubfäden aus demselben.  
 f. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und den 2 zurückgeschlagenen Narben.  
 g. Ein weibliches Krönggen aus dem Strahle.  
 h. Der Stempel aus demselben.

Wird bei uns meistens in Gärten gezogen, erreicht die Höhe von 1 und einem halben Fuß, blüht im August.

### 162. Tafel.

Streifenfarn. Pl. G. 1288. 24 Klasse.

### Tab. 161.

- Anthemis nobilis. Cl. XIX.  
 Anthemis foliis pinnato compositis linearibus acutis subvillosis. L. 646. 7.  
 Chamomilla romana.  
 a. Flos perversus ad perspicendum calycem.  
 b. Corolla composita radiata.  
 c. Corollula propria hermaphrodita.  
 d. eadem aperta.  
 e. Stamina 5 coalita ex ea.  
 f. Germen cum stylo filiformi et 2 stigmatibus revolutis.  
 g. Corollula feminea ex radio.  
 h. Stylus ejus.

Colitur plerumque apud nos in hortis, altitudinem sesquipedalem attingit, Augusto floret.

### Tab. 162.

Asplenium ruta muraria. Cl. XXIV.

Asple-







*Anthemis nobilis.* L.



*Asplenium ruta muraria*. L.










*Ruta graveolens.* L.



*Phytolacca decandra*. L.





Mauerraute. Steinraute.  
Linne Pf. S. 12 Th. S.

- a. Ein abgesondertes Blättgen mit den Befruchtungstheilen.
  - b. Ein Staubfägelchen.
- Wächst in dieser Gröfse an alten Mauern.

### 163. Tafel.

Raute. Pl. G. 563. 10 Klasse.  
Gartenraute. Weinraute.  
Linne Pf. S. 3 Th. S. 535.

- a. Die 5theilige Blumendecke, und 5blättrige Krone, der obersten Blume, mit den 10 Staubfäden.
- b. Der 4theilige Kelch.
- c. Die 4blättrige Krone mit den 8 Staubfäden der übrigen Blumen.
- d. Ein abgesondertes Kronblatt mit dem Staubfaden.
- e. Der Staubfaden abgesondert.
- f. Der Fruchtknoten, mit den 8 Honiggebenden Löffeln, dem Griffel, und der einfachen Narbe.
- g. Eben dieser geöffnet.
- h. Saamen.

Wächst in Gärten und Weinbergen, 2—3 Fuß hoch, blüht im Julius.

### 164. Tafel.

Kermesbeere. Pl. G. 639. 10 Klasse.  
Virginische Phytolake.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 692.

Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliolis cuneiformibus crenulatis, L. 785. 22.

Ruta ruraria.

Adiantum album.

- a. Folium separatum cum partibus fructificationis.
  - b. Globulus pollinaris.
- Crescit ad muros ruderatos, hac magnitudine.

### Tab. 163.

Ruta graveolens. Cl. X.  
Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. L. 331. 1.

Ruta hortensis.

- a. Perianthium quinquepartitum, et corolla pentapetala, floris supremi, cum 10 staminibus.
- b. Calix quadripartitus.
- c. Corolla tetrapetala cum staminibus 8 florum reliquorum.
- d. Petalum separatum cum stamine.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen cum 8 punctis melliferis, stylo et stigmate simplici.
- g. Idem apertum.
- h. Semen.


Crescit in hortis et vinetis, altitudine 2—3 pedali, floret Julio.

### Tab. 164.

Phytolacca decandra. Cl. X.  
Phytolacca floribus decandris, decagynis. L. 364. 2.

a. Co-





- a. Die 5blättrige Krone mit den 10 Staubfäden.
- b. Ein abgesonderter Staubfaden.
- c. Die 10 Fruchtknoten mit den Griffeln und einfachen Narben.
- d. Ein abgesonderter Fruchtknoten.
- e. Die freisrunde Beere.
- f. Saamen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, erreicht eine Höhe von 7—8 Fuß in einem Sommer, blüht im August und Septemb.

### 165. Tafel.

Salben. Pl. G. 43. 2 Klasse.  
Garten-Salben.  
Linne Pf. S. 3 Th. S. 38.

- a. Die einblättrige röhrigte Blumendecke.
- b. Die einblättrige rachenförmige Krone geöffnet, mit den 2 Staubfäden.  
Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der 4spaltige Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der 2spaltigen Narbe.  
Wird bei uns in Gärten gezogen, wird 2—3 Fuß hoch, blüht im Julius und August.

### 166. Tafel.

Metter. Pl. G. 1043. 19 Klasse.  
Mutterkraut.  
Linne Pf. S. 9 Th. S. 435.

- a. Die Blume von unten, um den gemeinschaftlichen Kelch zu sehen.

- a. Corolla pentapetala cum staminibus 10.
- b. Stamen separatum.
- c. Germina 10, cum stylis et stigmatibus simplicibus.
- d. Germen separatum.
- e. Bacca orbiculata.
- f. Semen.

Colitur apud nos in hortis, altitudinem 7—8 pedum per aestatem attingit, floret Augusto et Septembre.

### Tab. 165.

Salvia officinalis. Cl. II.  
Salvia foliis lanceolato ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. L. 64. 4.  
Salvia hortensis.

- a. Perianthium monophyllum tubulatum.
- b. Corolla monopetala ringens aperta, cum 2 staminibus.
- c. Stamen separatum.
- d. Germen quadrifidum, cum stylo filiformi et stigmate bifido.

Colitur apud nos in hortis altitudine 2—3 pedali, floret Julio et Augusto.

### Tab. 166.

Matricaria parthenium. Cl. XIX.  
Matricaria foliis compositis planis, foliolis ovatis incisis, pedunculis ramosis. L. 643. 1.

- a. Flos perversus ad perspicendum calycem communem.

b. Co-







*Salvia officinalis*: L.



*Matricaria parthenium*. L.










*Ceanothus americanus.* L.



*Carlina*  
*acaulis. L.*







- b. Die zusammengesetzte gestrahlte Krone.
  - c. Ein besonderes 5spaltiges Zwitterkröngen.
  - d. Die 5 zusammenhängende Staubfäden aus demselben.
  - e. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der 2spaltigen Narbe.
  - f. Ein weibliches Kröngen.
  - g. Der Stempel aus demselben.
- Wird bei uns in Gärten gezogen, ohngefähr 2 Fuß hoch, blüht im August.

## 167. Tafel.

Säckelblume. Pl. G. 284. 5 Klasse.

Nordamerikanischer Ceanothus Linne Pl. G. 3 Th. G. 262.

- a. Die 5theilige Blumendecke vor der Oefnung.
  - b. Diese geöffnet nebst den 5, auf den Nägeln abstehenden, gewölbten, sackförmigen Kronblättern, und den 5 Staubfäden.
  - c. Eben diese Blumentheile vergrößert.
  - d. Ein Lappen der Blumendecke.
  - e. Ein Kronblatt mit daran hängendem Staubfaden.
  - f. Der Fruchtknoten mit dem halb 3spaltigen Griffel und der stumpfen Narbe.
  - g. Die 3fächerige Beere.
  - h. Eben diese aufgeschnitten.
  - i. Saamen.
  - A. Ein Fruchttragender Zweig.
- Läßt sich bei uns in Gärten ziehen, und wird gegen 4 Fuß hoch, blüht im Julius und öfters im Herbst noch einmal.

b. Corolla composita radiata.

c. Corollula propria hermaphrodita quinquesida.

d. Ejus stamina 5 coalita.

e. Germen cum stylo filiformi et stigmate bifido.

f. Corollula feminea.

g. eius pistillum.

Colitur apud nos in hortis, altitudine bipedali, floret Augusto.

## Tab. 167.

Ceanothus americanus. Cl. V. Ceanothus foliis trinerviis. L.

197. I.

Radix ceanothi. Disp. Brünsvic.

a. Perianthium - quinquepartitum nondum apertum.

b. idem apertum, cum petalis 5, subrotundis, saecatis, unguibus insidentibus.

c. eadem partes magnitudine aucta.

d. Lacinium perianthii.

e. Petalum cum stamine adherente.

f. Germen cum stylo semitrifido.


g. Bacca tricocca.

h. Eadem aperta.

i. Semen.

A. Ramulus fructifer.

Coli potest in hortis et altitudinem 4 pedum attingit, floret Julio et saepius autumnosecunda vice.



## 168. Tafel.

Ebertwurz. Pl. G. 1002. 19  
Klasse.

Linne Pl. S. 9 Th. S. 193.

- a. Der gemeinschaftliche Kelch, dessen innerste glänzende Schuppen hier den Strahl bilden, und die zusammengesetzte Krone in der Mitte umgeben.
- b. Ein Zwitterkrönchen mit der Saamenkrone.
- c. Ebenz diese geöffnet.
- d. Die zusammenhängende, den Griffel umgebende Staubfäden.
- e. Der Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der ungetheilten Narbe.
- f. Saamen mit der ausgebreiteten Krone.

Wächst auf trockenen dürr-  
ren Heiden, und sitzt fast gänz-  
lich auf dem Boden, blüht im  
August.

## 169. Tafel.

Myrten. Pl. G. 671. 12 Klasse.

Linne Pl. S. 3 Th. S. 643.

- a. Die einblättrige 5spaltige Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone, mit den vielen im Kelch eingefügten Staubfäden.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Der Fruchtknoten.
- f. Eben dieser von oben, mit dem darauf sitzenden Griffel und der stumpfen Narbe.

## Tab. 168.

*Carlina acaulis.* Cl. XIX.

*Carlina caule uniflora, flore br-  
viore.* L. 607. I.

*Cardopatia.*

- a. Calix communis cujus squa-  
mae interiores nitidae radium  
componunt, et corollam com-  
positam in medio cingunt.
- b. Corollula hermaphrodita cum  
pappo.
- c. Eadem aperta.
- d. Filamenta  $\gamma$  coalita, stylum  
cingentia.
- e. Germen cum stylo filiformi  
et stigmate integro.
- f. Semen cum pappo extenso.

Crescit in locis siccis aridis,  
et fere sessilis est, floret Augu-  
sto.

## Tab. 169.

*Myrtus communis.* Cl. XII.


*Myrtus floribus solitariis, invo-  
lucro diphylo.* L. 384. I.

*Myrtus Italica.*

- a. Perianthium monophyllum  
quinquesidum.
- b. Corolla pentapetala cum fila-  
mentis numerosis calyci in-  
sertis.
- c. Petalum separatum.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen.
- f. idem à parte superiore cum  
stylo inserto et stigmate ob-  
tusulo.

g. Bac







*Myrtus communis.* L.

2000. 177.



*Tamarix germanica*. L










*Convallaria polygonatum*. L.

Tab. 172.



*Convallaria  
multiflora* L.





g. Die Beere.

h. Eben diese geöffnet.

Wird bei uns in Gärten gezogen, 5—6 Fuß hoch, blüht im August und September.

### Tab. 170.

Forst. Pl. G. 403. 5 Klasse.

Tamariskenstrauch.

Linne Pf. S. 3 Th. S. 372.

a. Die 5theilige Blumendecke.

b. Die 5blättrige Krone.

c. Ein abgesondertes Kronblatt.

d. Die 10 an der Basis zusammen gewachsene Staubfäden, davon die 5 äußern etwas länger sind.

e. Der Fruchtknoten mit den 3 Narben.

f. Eben dieser, die Quere durchschnitten.

Wächst auf sandigem feuchten Boden nahe bei Wassern zu einer kleinen Staude von 2—3 Fuß, blüht im Mai oder Junius.

### Tab. 171.

Zaunten. Pl. G. 457. 6 Klasse.

Weiskurz. Schminkurz.

Linne Pf. S. 6 Th. S. 333.

a. Die einblättrige glockenförmige Krone mit 6spaltiger Mündung.

b. Eben diese aufgeschnitten mit den 6 Staubfäden.

c. Ein abgesonderter Staubfaden.

d. Der runde Fruchtknoten mit dem Griffel und der zackigten Narbe.

g. Bacca.

h. Eadem aperta.

Colitur apud nos in hortis altitudine 5—6 pedum, floret Augusto et Septembre.

### 170. Tafel.

Tamarix Germanica. Cl. V.

Tamarix floribus decandris. L.

244. 2.

Tamariscus germanica.

a. Perianthium monophyllum.

b. Corolla pentapetala.

c. Petalum separatum.

d. Filamenta decem, basi connata, quorum 5 exteriora parum longiora.

e. Germen cum stigmatibus.

f. Idem transversim dissectum.

Crescit in locis humidis, sabulosis ad rivos, magnitudine fruticis parvi 2—3 pedum, floret Majo vel Junio.

### 171. Tafel.

Convallaria polygonatum. Cl. VI.

Convallaria foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. L. 275. 3.

Sigillum Salomonis.

a. Corolla monopetala campanulata, limbo sexfido.

b. Eadem aperta cum staminibus 6.

c. Stamen separatum.

d. Germen globosum cum stylo et stigmate trigono.

O 2

e. Bac.





## c. Zeitige Beere.

Wächst hier an Gebegen, selten 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im Junius.

Dies ist die gewöhnliche Weiswurz, öfters aber wird sie mit der nachfolgenden vermengt, die auch in ihren Bestandtheilen nicht von ihr unterschieden ist.

## 172. Tafel.

Zanten. Pl. G. 457. 6 Klasse.

Weiswurz. Schminkwurz.

Linne Pl. S. 6 Th. S. 334.

a. Die einblättrige, glockenförmige Krone, mit 6spaltiger Mündung.

b. Ein abgesonderter Staubfaden.

c. Der runde Fruchtknoten, Griffel, und zackigte Narbe.

d. Zeitige Beere.

Wächst bei der vorigen, wird aber oft 3 Fuß hoch, blüht zu gleicher Zeit.

## 173. Tafel.

Maulbeere. Pl. G. 1144. 21 Klasse.

Schwarzer Maulbeerbaum.

Linne Pl. S. 2 Th. S. 285.

a. Männliche Blüthe.

b. Eine abgesonderte. Die 4theilige Blumendecke mit den 4 Staubfäden.

c. Weibliche Blumen.

d. Die 4blättrige Blumendecke die Blättgen liegen wie in

e. übereinander.

## e. Bacca matura.

Crescit in nostris sepibus, raro altitudine sesquipedali, floret Junio.

Est sigillum Salomonis commune, sed saepius confunditur cum specie sequenti, neutiquam distincta ratione partium contuentium.

## Tab. 172.

Convallaria multiflora. Cl. VI.

Convallaria foliis alternis amplexicaulibus caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. L. 276. 4.

Sigillum Salomonis.

a. Corolla monopetala, campanulata limbo sexfido.

b. Stamen separatum.

c. Germen globosum, stylus, et stigma trigonum.

d. Bacca matura.

Crescit eodem cum praecedenti loco, sed altitudine saepius tripedali, eodem tempore floret.

## Tab. 173.

Morus nigra. Cl. XXI.

Morus foliis cordatis scabris. L. 710. 2.

a. Masculi flores.

b. Talis separatus. Perianthium quadripartitum cum staminibus 4.

c. Feminei flores.

d. Perianthium tetraphyllum, foliola uti in

e. incumbunt.

f. Ger-







*Morus nigra*. L.



*Hieracium pilosella* . L.










*Geum rivale*. L.



*Actaea Spicata. L.*





f. Der Fruchtknoten mit den 2 rauen Griffeln und einfachen Narben.

g. Eben dieser aufgeschnitten.

h. Zeitige Beere.

Dieser Baum wird bei uns in Gärten gezogen, wo der Winter nicht allzustrenge ist, er blüht anfangs Junii.

### 174. Tafel.

Habichtkraut. Pl. G. 986. 19 Klasse.

Mausohrlein. Nagelkraut.

Linne Pl. S. 9 Th. S. 65.

a. Der walzenförmige gemeinschaftliche Kelch.

b. Die zusammengesetzte offene Krone.

c. Eben diese von unten.

d. Ein Zwitterkrögen.

e. Die Geschlechtstheile ohne das Kronblatt, nämlich die 5 Staubfäden, der Fruchtknoten mit der Saamenkrone, dem fadenförmigen Griffel, und den 2 gekrümmten Narben.

f. Die 5 zusammenhängende Staubfäden.

g. Saamen mit der Krone.

Wächst auf trockenen bergigten Gegenden in dieser Grösse, blüht im May und Junius.

### 175. Tafel.

Garaffel. Pl. G. 691. 12 Klasse. Wasserbenediktswurz. Wiesen-garaffel.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 172.

f. German cum stylis 2 scabris, et stigmatibus simplicibus.

g. Idem dissectum.

h. Bacca matura.

Colitur apud nos in hortis, ubi hyems non admodum fera est, floret initio Junii.

### Tab. 174.

Hieracium pilosella. Cl. XIX.

Hieracium foliis integerrimis ovatis subtus tomentosis stolonibus repentibus, scapo unifloro. L. 597. 4.

Auricula muris.

a. Calyx communis cylindraceus.

b. Corolla composita aperta.

c. Eadem ab inferiore parte.

d. Corollula hermaphrodita.

e. Sexus partes absque petalo, stamina 5, scilicet germen cum pappo, stylo filiformi et stigmatibus 2 recurvatis.

f. Stamina 5 coalita.

g. Semen cum pappo.

Crescit in montosis siccis regionibus hac magnitudine, floret Majo et Junio.

### Tab. 175.

Geum rivale. Cl. XII.

Geum floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis tortis. L. 399. 5.


Caryophyllata aquatica.

Geum palustre.

D 3

2. Peri-





- a. Die einblättrige halb 10spaltige Blumendecke.  
 b. Die 5blättrige Krone mit dem Kelch in natürlichem Zustande.  
 c. Eben diese geöffnet, um die zahlreichen im Kelch eingefügten Staubfäden zu sehen.  
 d. d. 2 abgesonderte Kronblätter von beeden Seiten.  
 e. Ein abgesonderter Staubfaden.  
 f. Die zahlreichen Fruchtknoten mit den haarigten Griffeln und einfachen Narben.  
 g. Ein abgesonderter Fruchtknoten mit dem Griffel —  
 h. ohne denselben.  
 i. Saamen mit der verdrehten Granne.

Wächst an den Gehägen der Bäche 1 und einen halben Fuß hoch, blüht im May.

- a. Perianthium monophyllum semidecemfidum.  
 b. Corolla pentapetala cum Calyce in statu naturali.  
 c. Eadem aperta ad perspicienda stamina numerosa, calyci inserta.  
 d. d. Petala 2 separata ab utraque parte.  
 e. Stamen separatum.  
 f. Germina numerosa cum stylis pilosis et stigmatibus simplicibus.  
 g. Germen separatum cum stylo —  
 h. sine stylo.  
 i. Semen cum arista geniculata.

Crescit ad sepes rivulorum, altitudine sesquipedali, floret Majo.

### 176. Tafel.

Schwarzwurz. Pl. G. 698. 13 Klasse.

Christophkraut.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 181.

- a. Die 4blättrige Blumendecke.  
 b. Ein abgesondertes Blatt davon.  
 c. Die 4 Kronblätter an beeden Enden zugespitzt, diese und die Blumendecke fallen ab, und bleiben nur die Geschlechttheile, in einer Eyzförmigen Aehre  
 d. stehen.  
 e. Die vielen Staubfäden.  
 f. Ein abgesonderter.  
 g. Ein Kronblatt.  
 h. Der Eyrunde Fruchtknoten mit der dicken Narbe.

### Tab. 176.

*Actaea spicata*. Cl. XIII.

*Actaea racemo ovato*, fructibus baccatis. L. 406. 1.

Christophoriana.

- a. Perianthium tetraphyllum.  
 b. Foliolum separatum.

c. Petala 4 utrinque acuminata simul cum perianthio, caduca, relictis partibus sexus in spicam

- d. ovalem congestis  
 e. Stamina numerosa.  
 f. tale separatam.  
 g. Petalum.  
 h. Germen ovatum cum stigmate crassiusculo.

i. Bac-







*Prunus padus* L.



*Juniperus communis*. L.





## i. Zeitige Beere.

Wächst hier in den Gehegen  
2—3 Fuß hoch, blüht im Ju-  
nius. Diese wird meistens statt  
der *Actaea racemosa*. T. 35. ge-  
nommen.

## i. Bacca matura.

Crescit in sepibus nostris alti-  
tudine 2—3 pedali, floret Junio.  
Species haec ut plurimum  
*Actaeae racemosae* T. 35. substi-  
tuitur.

## 177. Tafel.

Pflaumen. Pl. G. 675. 12  
Klasse.

Elsenbeere.

Linne Pfl. S. 1 Th. S. 731.

- a. Die einblättrige 5spaltige  
Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt.
- d. Die im Kelch eingefügten  
zahlreichen Staubfäden.
- e. Ein Lappen der Blumendecke  
mit einem Theil der Staub-  
fäden.
- f. Ein abgesonderter Staubfa-  
den.
- g. Der rundlichte Fruchtknoten,  
mit dem Griffel und kreis-  
runden Narbe.
- h. Die 2 aussen an den Blät-  
tern befindlichen Drüsen.

Wächst an Gehegen 4-5 Fuß  
hoch, blüht im May. Bergius  
empfiehlt dessen Gebrauch.

## Tab. 177.

*Prunus padus*. Cl. XII.

*Prunus floribus racemosis, foliis  
deciduis basi subtus biglandu-  
losis*. L. 385. 1.

*Cerasus avium*.

- a. *Perianthium monophyllum  
quinquesidum*.
- b. *Corolla 5 petala*.
- c. *Petalum separatum*.
- d. *Stamina numerosa calyci in-  
serta*.
- e. *Lacinium perianthii cum par-  
te staminum*.

f. *Stamen separatum*.

g. *Germen subrotundum cum  
stylo et stigmate orbiculato*.

h. *Glandulae binae, basi folio-  
rum exteriori insertae*.

Crescit ad sepes, altitudine  
4—5 pedum, floret Majo; A  
Cel. Bergio usus ejus commen-  
datur medicinalis.

## 178. Tafel.

Wachholder. Pl. G. 1235. 22  
Klasse.

Gemeiner Wachholder.

Linne Pfl. S. 2 Th. S. 473.

A. Männliche Pflanze.

- a. Der Kelch an dessen Spindel  
3 Reihen Schuppen wie in -

## Tab. 178.

*Juniperus communis*. Cl. XXII.

*Juniperus foliis ternis patenti-  
bus, mucronatis, bacca lon-  
gioribus*. L. 749. 1.

A. Mas.

- a. *Calyx cujus rachi communi  
3 squamae in triplici opposi-  
tione*

b. op-





- b. befindlich sind, so daß 9 sich daran befinden.
- c. Ist der untere Theil eines solchen Schuppens.
- d. Der obere oder innere, an welchem 3 Staubfäden angewachsen sind.
- e. Ist das oberste oder Endblüthen, welches das rote ausmacht, an welchem sich ebenfalls 3 Staubfäden, mit kaum merklichen Stielgen befinden, davon einer in
- f. abgesondert ist.
- B. Weibliche Pflanze.
- g. Die kleine 3theilige Blumendecke.
- h. Die 3blättrige Krone.
- i. Der Fruchtknoten, auf welchem die 3 Griffel
- k. sitzen, die sich zusammenschließen.
- Ist die äussere
- m. die innere hohle Seite eines solchen Griffels.
- n. Unzeitige 2jährige -
- o. Zeitige 3jährige Beere.
- p. Eine solche entzweigeschnittene.
- q. Samen.
- Wächst auf trockenen Heiden, wird bei uns selten 4 Fuß hoch, blüht im May.
- b. oppositae sunt, ita ut 9 appareant.
- c. Pars inferior talis squamae.
- d. Pars superior vel interior, cui 3 stamina adhaerent.
- e. Squama decima, terminans amentum, cui similiter adhaerent stamina 3 pedunculis vix notabilibus, quorum unus in
- f. separatus apparet.
- B. Femina.
- g. Perianthium tripartitum minimum.
- h. Corolla tripetala.
- i. Germena cui insident 3 styli
- k. conniventes.
- l. Pars exterior —
- m. interior, cava, talis styli.
- n. Baccae immaturae biennes -
- o. Maturae triennes.
- p. Bacca dissecta.
- q. Semen.
- Crescit in locis aridis, attingit apud nos raro altitudinem 4 pedum, floret Majo.

### 179. Tafel.

Wotzbart. Pl. G. 978. 19 Klasse.  
Habermurzel.  
Linne Pl. S. 9 Th. S. 3.

- a. Der gemeinschaftliche, lange, walzenförmige Kelch. (Er ist sehr oft ein Drittel kürzer als die Krone.)
- b. Die zusammengesezte Krone.

### Tab. 179.

Tragopogon pratensis. Cl. XIX.  
Tragopogon calycibus corollae  
radium aequantibus, foliis integris strictis. L. 592. 1.

- a. Calix communis, longus, cylindraceus. (Saepius tertio parte brevior est corolla.)
- b. Corolla composita.





*Tragopogon pratense*. L.



*Rhodiola rosea* L.





- e. Eines der äussern Zwitterfröngen, mit den Geschlechts- theilen.
- d. Diese besonders.
- e. Die 5 abgesonderte zusammenhängende Staubfäden.
- f. Der Fruchtknoten mit der Saamentrone.
- g. Eben dieser mit dem fadenförmigen Griffel und den 2 zurückgeschlagenen Narben.
- h. Ein Kelchblatt von innen.

Wächst bei uns häufig in Wiesen, wird bei 2 Fuß hoch, blüht im May.

### 160. Tafel.

Rhodiservurz. Pl. G. 1224. 22 Klasse.

Rosenvurz.

Linne Ph. G. 10 Th. G. 288.

- a. Die 4theilige Blumendecke.
- b. Die 4blättrige Krone, mit den 8 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Ein abgesondertes Kronblatt.
- e. Die 4 unfruchtbaren Fruchtknoten mit den 4 Honigdrüsen.
- f. Eine Blume der weiblichen Pflanze, (die übrigen der männlichen gleich ist) mit den 4 Fruchtknoten, und der Honigbehältnissen, vergrößert.

Wird bei uns in Gärten gezogen, ohngefähr 1 Fuß hoch, blüht im Junius.

### 158. Tafel.

Bux. Pl. G. 1142. 21 Klasse. Buxbaum.

Männliche Blumen.

- a. Die 3blättrige Blumendecke.

c. Corollula hermaphrodita ex radio cum sexu.

d. Sexus partes separatae.

e. Stamina 5 separata coalita.

f. Germen, cum Pappo seminis.

g. Idem cum stylo filiformi et stigmatibus 2 revolutis.

h. Foliolum Calycis ab interiore parte.

Crescit abunde in pratis nostris altitudine bipedali, floret Majo.

### Tab. 180.

Rhodiola rosea. Cl. XXII.

Rhodiola. L. 745. 1.

Rhodia. Rosaria.

a. Perianthium tetraphyllum.

b. Corolla tetrapetala cum staminibus 8.

c. Stamen separatum.

d. Petalum separatum.

e. Germina 4 abortientia, cum nectariis.

f. Flos plantae femineae (quae caeteroquin plantae masculae similis est) cum germinibus 4, et nectariis, magnitudine aucta.

Colitur apud nos in hortis, altitudine circiter pedali, floret Junio.

### Tab. 181.

Buxus sempervirens. Cl. XXI.

Buxus. L. 709. 1.

Flores masculi.

a. Perianthium triphyllum.

W

b. Co-



- b. Die 2blättrige Krone.
- c. Beide beisammen.
- d. Die 4 Staubfäden.
- e. Ein abgesonderter.

Weibliche Blumen unter den männlichen.

- f. Die 4blättrige Blumendecke.
- g. Die 3blättrige Krone.
- h. Beide beisammen.
- i. Der zeckigte Fruchtknoten mit den 3 Griffeln und stumpfen Narben, in der Blume,
- k. ausser derselben.

Ist die Zierde unserer Gärten zu Einfassung der Blumenbeete, wächst sonst in Frankreich, Savoyen u. wild und 5-6 Fuß hoch, blüht im May.

- b. Corolla bipetalz.
- c. Ambo simul.
- d. Stamina 4.
- e. Stamen separatum.

Flores feminei.

- f. Perianthium tetraphyllum.
- g. Corolla 3 petala.
- h. Ambo simul.
- i. Germen trigonum cum 3 stylis, et stigmatibus obtusis in flore,
- k. hae partes separatae.

Ad circumadanda et ornanda florum tectula inservit haec planta, sponte crescit in Gallia, Sabaudia &c. altitudine 5—6 pedum, floret Majo.

### 182. Tafel.

Adonis. Pl. G. 754. 13 Klasse.

Linne Pf. S. 7 Th. S. 325.

- a. Die 5blättrige Blumendecke.
- b. Die 12blättrige Krone, sie hat sehr oft 14. 15. und 16 Blätter an der gleichen Pflanze.
- c. Ein Theil der zahlreichen Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter derselben.
- e. Die zahlreichen Fruchtknoten.
- f. Ein abgesonderter.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst aber in wärmern Gegenden an sonnenreichen Hügeln wild, sie wird 1 Fuß hoch, blüht im May.

### Tab. 182.

Adonis vernalis. Cl. XIII.

Adonis flore dodecapetalo fructu ovato. L. 427. 3.

Bupthalmum.

- a. Perianthium pentaphyllum.
- b. Corolla 12 petala, saepius petalis 14. 15. vel 16 in eadem planta instructa.
- c. Pars staminum numerosorum.
- d. Stamen separatum.
- e. Germina numerosa.
- f. Tale separatum.

Colitur apud nos in hortis, crescit quoque in regionibus calidioribus in collum apricis, altitudine pedali, floret Majo.

### 183. Tafel.

Indig. Pl. G. 959. 17 Klasse.

Linne Pf. S. 4 Th. S. 287.

### Tab. 183.

Indigofera tinctoria. Cl. XVII.

Indigofera foliis pinnatis obovatis racemis brevibus, caule suffruticoso. L. 564. 1.

a. Pe-





*Buxus sempervirens. L.*





*Adonis vernalis. L.*










*Indigofera tinctoria. L.*



*Sanguisorba  
officinalis. L.*







- a. Die einblättrige 5zählige Blumendecke.  
 b. b. Die schmetterlingsförmige Krone.  
 c. Eben diese vergrößert.  
 d. Die Fahne.  
 e. e. Die 2 Flügel.  
 f. Das Schifgen.  
 g. Die Staubfäden, 1 einfacher und 9 verwachsene, in deren Mitte raget der Stempel hervor.  
 h. h. Die Schoten.  
 i. Eben diese geöffnet mit den Saamen.  
 k. Die andere leere Hälfte dieser Schote von innen.  
 l. Saamen.  
 Sie wächst in Ost- und Westindien von 5 – 6 Fuß hoch, blüht im Julius.

## 184. Tafel.

Wiesentknopf. Pl. G. 153. 4. Klasse  
 Welsche Bibernell. Steinpeterslein.

Linne Ps. G. 5 Th. G. 330.

- a. Die 2blättrige Blumendecke.  
 b. Die einblättrige, 4theilige Krone.  
 c. Eben diese von unten, mit dem 2blättrigen Kelch.  
 d. Die 4 Staubfäden.  
 e. Der Fruchtknoten mit dem kurzen Griffel und der stumpfen Narbe.  
 f. Eben dieser in die Quere durchschnitten.

Wächst auf dürrer und magern Wiesen, bei 2 Fuß hoch, blüht im May oder Junius.

## 185. Tafel.

Nieswurz. Pl. G. 758. 13. Klasse.

a. Perianthium monophyllum 5dentatum.

b. b. Corolla papilionacea.

c. eadem magnitudine aucta.

d. Ejus vexillum.

e. e. alae duae.

f. Carina.

g. Stamina, simplex ac novemfidum, quorum in medio pistillum prominet.

h. h. Legumina.

i. tale apertum cum seminibus.

k. altera pars dimidia vacua ab interna parte conspicienda.

l. Semen.

Crescit in India utraque, altitudine 5 – 6 pedum, floret Julio.

## Tab. 184.

Sanguisorba officinalis. Cl. IV.

Sanguisorba spicis ovatis. L. 133.

Pimpinella Italica nigra.

a. Perianthium diphyllum.

b. Corolla monopetala quadripartita.

c. Eadem a parte inferiore cum perianthio diphylo.

d. Stamina 4.

e. Germen cum stylo brevi et stigmate obtuso.

f. Idem transversim dissectum.


Crescit in pratis aridis et maris, altitudine bipedali, floret Majo vel Junio.

## Tab. 185.

Helleborus niger. Cl. XIII.

Pl. 2

Helle-



**Schwarze Kiebwurz.** Christwurz.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 371.

- a. Die 5blättrige Krone von oben.
- b. Eben diese von unten.
- c. Eines der Honigbehältnisse, deren viele im Kreis herum stehen.
- d. Eben dieses aufgeschnitten.
- e. Ein abgesonderter von den zahlreichen Staubfäden.
- f. Die 6 Fruchtknoten.
- g. Ein abgesonderter.
- h. Dieser geöffnet.

Wächst auf unsern und den Tirolischen Gebürgen, blüht in den ersten Frühlingstagen noch unter dem Schnee hervor, in dieser Grösse.

*Helleborus scapo subbifloro, subnudo, foliis pedatis. L. 431 2*

*Melampodium Veratrum nigrum*

- a. Corolla 5 petala a superiore.
- b. Ab inferiore parte.
- c. Nectarium separatum, quorum plura in orbem posita sunt.
- d. Idem apertum.
- e. Unum separatum, ex numerosis staminibus.
- f. Germina 6.
- g. Unum separatum.
- h. Idem apertum.

Crescit in montibus nostris, et Tyrolensibus, floret ineunte vere, interdum sub nive, magnitudine iconis.

### 186. Tafel.

**Schwertel.** Pl. G 65. 3 Klasse. Florentinische Weiz oder Bio: lenwurz.

Linne Pl. S. 11 Th. S.

- a. Die 2klappige Scheide.
- b. Die 6theilige Krone.
- c. Ein härtiges Kronblatt, mit daran hängendem Staubfaden.
- d. Einer der 3 Staubfäden abgesondert.
- e. Der längliche Fruchtknoten mit der 4theiligen Narbe, deren 3 Lappen oben 2spaltig sind, Kronblättern gleichen, und deren jeder einen Staubfaden auf ein Kronblatt, c, zurückbieget.
- f. Der Fruchtknoten in die Quere durchschnitten, 3fächerig.

Wird bei uns in Gärten gezogen, bei 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

### Tab. 186.

*Iris Florentina, Cl. III.*

*Iris corollis barbatis caule foliis altiore subbifloro, floribus sessilibus. L. 78. 2.*

- a. Spatha bivalvis.
- b. Corolla sexpartita.
- c. Petalum barbatum cum stamine adhaerente.
- d. Unum 3 staminum separatum.
- e. Germen oblongum, cum stigmate trifido, cujus laciniae 3, apice bifidae sunt, petala referunt, et quarum singulae, stamen unicui ad superficiem petali reflectunt.

- f. Germen transversim dissectum triloculare.

Colitur apud nos in hortis, altitudine bipedali, floret Junio.

Tab.





*Helleborus niger* L.

B. Thanner del.

J. S. Leitner fec.





*Iris florentina. L.*









*Iris pseudacorus*. L



*Iris Germanica* . L .







## 187. Tafel.

Schwertel. Pl. G. 65. 3 Klasse.  
Selbe Schwertelwurz. Acker-  
mann.

Selbe Schwertlilie.

Linne Pf. S. 11 Th. S.

- a. Die 2klappige Scheide.
- b. Die 6theilige Krone.
- c. Ein äußeres Kronblatt, mit einem der 3 Staubfäden.
- d. Der 3theilige, tiefgefurchte Fruchtknoten, mit dem kurzen Griffel und der grossen 3lappigten Narbe.

- e. Der Fruchtknoten in die Quere durchschnitten.

Wächst an unsern stehenden Wassern, wird 4—5 Fuß hoch, blüht im Junius.

## 188. Tafel.

Schwertel. Pl. G. 65. 3 Klasse.  
Gemeine Beilwurz.

Blaue Schwertel.

Linne Pf. S. 11 Th. S.

- a. Die 2klappige Scheide.
- b. Die 6theilige Krone, die 3bärtigen Blätter zurückgeschlagen.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt mit daran hängendem Staubfaden, deren 3 ähnliche in der Blume sind.
- d. Der Fruchtknoten, nebst dem Griffel und den 3 Kronblättern ähnlichen Narben.
- e. Der Fruchtknoten die Quere durchschnitten.

Wächst bei uns in den Gärten, ohngefähr 2 Fuß hoch, blüht im Junius.

## Tab. 187.

*Iris pseud'acorus*. Cl. III.

*Iris corollis imberbibus*, petalis interioribus stigmatе minoribus, foliis ensiformibus. L. 79. 10.

*Acorus vulgaris*. *Pseudacorus*.

a. *Spatha bivalvis*.

b. *Corolla sexpartita*.

c. *Petalum exterius*, cum stamine quorum tria in flore.

d. *Germen trigonum sulcatum cum stylo brevi, et stigmatе maximo 3 partito*.

e. *Germen transversim dissectum*.

Crescit ad lacus nostros, altitudine 4—5 pedum, floret Junio.

## Tab. 188.

*Iris germanica*. Cl. III.

*Iris corollis barbatis*, caule foliis altiore multiflora, floribus inferioribus pedunculatis. L. 78. 3.

*Iris nostras*. *Iris vulgaris*.

a. *Spatha bivalvis*.

b. *Corolla sexpartita, petala 3-barbata reflexa*.

c. *Petalum separatum cum stamine adhaerente, quorum 3 in flore*.

d. *Germen cum stylo et stigmatibus 3 petala referentibus*.

e. *Germen transversim dissectum*.

Crescit in nostris hortis, altitudine prope bipedali, floret Junio.



## 189. Tafel.

Preuss. Pl. G. 27. 2. Klasse.  
Linne Pl. S. 5 Th. S. 64.

- a. Die 4theilige Blumendecke mit dem Deckblatt.
- b. Die einblättrige, radförmige Krone, mit 4theiliger Mündung.
- c. Eben diese aufgeschnitten, mit den 2 Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Der Stempel.

Wächst häufig in unsern Wäldern von dieser Grösse, blüht im Junius.

## 190. Tafel.

Mespel. Pl. G. 680. 12. Klasse.  
Mispeln.  
Linne Pl. S. 1 Th. S. 778.

- a. Die einblättrige 5theilige Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone, mit den 20 in den Kelch eingefügten Staubfäden.
- c. Ein Kronblatt.
- d. Ein abgesonderter Staubfaden.
- e. Der Fruchtknoten mit den 5 Griffeln und den knospenförmigen Narben.
- f. Dieser in die Quere durchgeschnitten, um die 5 Saamen zu sehen.
- g. Die zeitige Frucht.  
Dieser Baum wird bei uns in Gärten gezogen, blüht im May oder Junius

## Tab. 189.

*Veronica officinalis*. Cl. II.

*Veronica spicis lateralibus pendunculatis, foliis oppositis, caule procumbente*. L. 56. 9.

- a. Perianthium 4dripartitum cum bractea.
- b. Corolla monopetala, rotata, limbo 4dripartito.
- c. Eadem aperta cum 2 staminibus.
- d. Stamen separatum.
- e. Pistillum.

Crescit abunde in sylvis nostris, hac magnitudine, floret Junio.

## Tab. 190.

*Mespilus Germanica*. Cl. XII.

*Mespilus inermis, foliis lanceolatis subtus tomentosis, floribus solitariis sessilibus*. L. 388.

- I.
- a. Perianthium monophyllum 5fidum.
- b. Corolla pentapetala cum staminibus 20, calyci insertis.
- c. Petalum.
- d. Stamen separatum.
- e. Germen cum stylis 5 et stigmatibus capitatis.
- f. Idem transversim dissectum ut semina 5 in conspectum veniant.
- g. Bacca matura.  
Colitur arbor in nostris hortis et Majo vel Junio floret.

Tab.





*Veronica officinalis*. L.





*Mespilus germanica* L.










*Isatis tinctoria sativa* L.



*Scandix Ceresolium* L.







## 191. Tafel.

Waid. Pl. G. 886. 15 Klasse.

Linne Pf. G. 8 Th. G. 373.

- a. Die 4blättrige Blumendecke.
- b. Die 4blättrige kreuzförmige Krone.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt.
- d. Die 6 Staubfäden, deren 2 kürzer als die 4 übrigen sind.
- e. Ein abgesonderter Staubfaden.
- f. Der länglichte zweischneidige Fruchtknoten, mit der stumpfen Narbe.
- g. Die Schötgen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, wächst 3—4 Fuß hoch, blüht im May und Junius.

## 192. Tafel.

Kerbel. Pl. G. 387. 5 Klasse.

Körbelfraut.

Linne Pf. G. 6 Th. G. 157.

- a. Die allgemeine Dolbe.
- b. Die besondern Dolden.
- c. Die besondere 5blättrige Hülse.
- d. Ein besonderes 5blättriges Krönchen mit den 5 Staubfäden.
- e. Ein abgesonderter Staubfaden.
- f. Der länglichte Fruchtknoten, mit den 2 Griffeln und einem daran hängenden Staubfaden.
- g. Saamen.

Wird bei uns in Gärten gezogen 2—3 Fuß hoch, blüht im Junius.

## Tab. 191.

Isatis tinctoria. Cl. XV.

Isatis foliis radicalibus oblongo-ovatis, caulinis sagittatis, siliculis oblongis. L. 505. 1.

- a. Perianthium tetraphyllum.
- b. Corolla tetrapetala cruciformis.
- c. Petalum separatum.
- d. Stamina 6, quorum 2 breviora reliquis.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen oblongum, anceps, cum stigmate obtuso.

g. Siliculae.

Colitur apud nos in hortis, altitudine 3—4 pedali, floret Majo vel Junio.

## Tab. 192.

Scandix cerefolium. Cl. V.


Scandix feminibus nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. L. 237. 3.

Chaerefolium.

- a. Umbella universalis.
- b. Umbella partialis.
- c. Involucrum parziale 5phyllum.
- d. Corollula propria 5petala cum staminibus 5.
- e. Stamen separatum.
- f. Germen oblongum, cum stylis 2 et stamine adhaerente.
- g. Semen.

Colitur in hortis nostris altitudine 2—3 pedali, Junio floret.

Tab.



## 193. Tafel.

## Tab. 193.

Wintergrün. Pl. G. 597. 10  
Klasse.

Holz: Wald: Mangold.

Linne Pl. S. 6 Th. S. 503.

- a. Die 5theilige Blumendecke.
- b. Die 5blättrige Krone.
- c. Ein abgesondertes Kronblatt.

- d. Die 10 aufwärts stehenden Staubfäden.

- e. Ein abgesonderter, oben 2hörig.

- f. Der runde 5eckigte Fruchtknoten mit dem langen Griffel und der dicken Narbe.

Wächst in Wäldern und an schattigten Gehegen, wird benähe 1 Fuß hoch, blüht im Junius.

*Pyrola rotundifolia*. Cl. X.

*Pyrola staminibus adscendenti-*  
*bus, pistillo declinato.* L. 340.

- a. *Perianthium 5partitum.*

- b. *Corolla 5 petala.*

- c. *Petalum separatum.*

- d. *Stamina 10 adscendentia.*

- e. *Stamen separatum sursum bicornae.*

- f. *Germen rotundum pentagonum, cum stylo longo et stigmate crassiusculo.*

*Crescit in sylvis et sepibus umbrosis, altitudine prope pedali, floret Junio.*

## 194. Tafel.

## Tab. 194.

Hanenfuss. Pl. G. 755. 13 Klasse.

Brennender Hanenfuss.

Linne Pl. S. 7 Th. S. 354.

- a. Die 5blättrige Blumendecke.

- b. Die 5blättrige Krone mit den zahlreichen Staubfäden.

- c. Eben diese von unten.

- d. Ein abgesondertes Kronblatt mit 2 daran hängenden Staubfäden.

- e. Die zahlreichen Fruchtknoten.

- f. Ein abgesonderter mit der gebogenen Narbe.

Wächst häufig in allen Wiesen, blüht den ganzen Sommer, wird 2—3 Fuß hoch.

*Ranunculus acris*. Cl. XIII.

*Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis summis linearibus.* L. 430.

- a. *Perianthium pentaphyllum.*

- b. *Corolla pentapetala cum staminibus numerosis.*

- c. *Eadem ab inferiore parte:*

- d. *Petalum separatum cum 2 staminibus adhaerentibus.*

- e. *Germina numerosa.*

- f. *Germen separatum cum stigmate reflexo.*

*Crescit abunde in pratis, floret per totam aestatem, altitudine 2—3 pedali.*

Tab.



Tab 193.



*Pyrola rotundifolia*. L.





*Ranunculus acris*. L.










*Scandix odorata*. L.



*Laurus Sassafras*. L.







## 195. Tafel.

Körbel. Pl. G. 385. 5 Klasse.  
Welscher, Spanischer Körbel.  
Linne Pf. S. 6 Th. S. 154.

- a. Die besondere 5blättrige Hülse.
- b. Ein besonderes 5blättriges Kröngen mit den 5 Staubfäden.
- c. Ein abgesonderter Staubfaden.
- d. Der länglichte Fruchtknoten, mit den 2 Griffeln und stumpfen Narben, aus der Blume.
- e. Eben dieser nach abgefallenen Kronblättern.
- f. Die eckigte Frucht.
- g. Eben diese in 2 Theile getheilt.
- h. Die 2 herausgenommene Saamen.
- i. Ein Querschnitt der Frucht, um die Ecken zu sehen.

Wird bei uns in Gärten gezogen, 3—4 Fuß hoch, blüht im Junius.

## 196. Tafel.

Lorbeer. Pl. G. 543. 9 Klasse.  
Sassafras. Fenchelholz.  
Linne Pf. S. 1 Th. S. 535.

- a. Männliche Blüthe mit 6 Kronblättern und 9 Staubfäden, an welchen unten Drüsen befindlich sind.
- b. Eine solche mit einem Stempel ohne Fruchtknoten.
- c. Die 9 Staubfäden.
- d. Ein abgesonderter.
- e. Eine abgesonderte Drüse.

## Tab. 195.

*Scandix odorata*. Cl. V.  
*Scandix feminibus sulcatis angulatis*. L. 237. 1.

*Myrrhis odorata*.

a. *Involucrum parziale pentaphyllum*.

b. *Corollula propria 5petalâ cum staminibus 5*.

c. *Stamen separatum*.

d. *Germen oblongum cum filamentis 2, et stigmatibus obtusis, ex flore*.

e. *Idem petalis defloratis*.

f. *Fructus subulatus*.

g. *Idem in 2 partes divisus*.

h. *Semina bina exempta*.

i. *Taleolum fructus transversim dissectum, ad perspiciendam figuram angulosam*.

Colitur apud nos in hortis altitudine 3—4 pedali, floret Junio.

## Tab. 196.

*Laurus Sassafras*. Cl. IX.

*Laurus foliis trilobis integrisque*. L. 318. 11.

*Sassafras*.

a. *Flos masculus cum petalis 6 et 9 staminibus, cum glandulis prope basin affixis*.

b. *Talis cum pistillo sine germine*.

c. *Stamina 9*.

d. *Stamen separatum*.

e. *Glandula separata*.

Q

f. Pi-



- a. Der abgesonderte Stempel mit den 2 Drüsen.
- g. Zwitterblumen, von unten,
- h. von oben, mit 6 Kronblättern, 6 Staubfäden, und dem Stempel.
- i. Eine solche mit 5 Kronblättern.
- k. Der abgesonderte Stempel.
- l. Die Drüse.
- m. Frische Beere.
- n. Derselben Kelch.
- o. Dieser trocken.
- p. Der Kelch von unten und oben.
- q. Eine trockene Beere.
- r. Die Nuß aus derselben.
- s. Diese geöffnet, mit dem Kern.
- t. Die leere Schale.
- u. Der Kern.

Dieser Baum wächst in Nordamerika häufig, und wird sehr groß.

- f. Pistillum separatum cum 2 glandulis.
- g. Flores hermaphroditi à parte inferiore
- h. à parte superiore cum petalis 6, filamentis 6, et pistillo.
- i. Talis cum petalis 5.
- k. Pistillum separatum.
- l. Glandula.
- m. Baccæ recentes.
- n. Earum calyx.
- o. Idem siccus.
- p. Calyx ab inferiore et superiore parte.
- q. Bacca siccata.
- r. Ejus nux.
- f. Eadem aperta cum nucleo.
- t. Drupa vacua.
- u. Nucleus.

Copiose arbor crescit in America septentrionali magna altitudine.

### 197. Tafel.

Fackel. Pl. G. 261. 5 Klasse.  
Wollkraut. Königsferze.  
Linne Pf. S. 5 Th. S. 621.

- a. Die einblättrige 5theilige Blumendecke.
- b. Die einblättrige Krone, mit 5theiliger Mündung.
- c. Eben diese aufgeschnitten, mit den 5 Staubfäden.
- d. Einer der 3 kürzern haarigten Staubfäden.
- e. Einer der 2 längern nackten.
- f. Der rundlichte Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der dicken Narbe.

### Tab. 197.

- Verbascum thapsus. Cl. V.  
Verbascum foliis decurrentibus utrinque tomentosis caule simplicis. L. 183. 1.  
Thapsus barbatus.
- a. Perianthium monophyllum 5partitum.
  - b. Corolla monopetala, limbo 5partito.
  - c. Eadem aperta cum staminibus 5.
  - d. Unum ex filamentis 3 brevioribus villosis.
  - e. Unum ex 2 longioribus nudis.
  - f. Germen subrotundum cum stylo filiformi et stigmate crassiusculo.





*Verbascum*

*Thapsus*. L.






*Anchusa* *officinalis*. L.







Wächst hier an unfruchtbaren steinigten Orten, wird 3—4 Fuß hoch, blüht im Julius.

### 198. Tafel.

Ochsenzunge. Pl. G. 192. 5 Klasse.

Linne Pf. S. 5 Th. S. 415.

- a. Die 5theilige Blumendecke mit dem Deckblatt.
  - b. Die einblättrige trichterförmige Krone, mit halbfünfspaltiger Mündung.
  - c. Eben diese geöffnet mit den 5 Staubfäden, und 5 Schüppgen, so die Staubfäden bedecken.
  - d. Ein abgesonderter Staubfaden.
  - e. Die 4 Fruchtknoten mit dem fadenförmigen Griffel und der stumpfen ausgeschnutzen Narbe.
  - f. Saamen am Kelchboden.
- Wächst an ungebauten steinigten Orten wild, wird 2—3 Fuß hoch, blüht im Julius.

### 199. Tafel.

Ramsel. Pl. G. 918. 17 Klasse. Kreuzblume.

Linne Pf. S. 8 Th. S. 486.

- a. Die 3blättrige Blumendecke.
- b. Die schmetterlingsförmige Krone.
- c. c. Die 2 Flügel.
- d. Die Fahne mit dem Schiffgen.
- e. Die Fahne offen.
- f. Das Schiffgen mit den 8 verwachsenen Staubfäden.

Crescit ad ruderata et in locis lapidosis, altitudine 3—4 pedali, floret Julio.

### Tab. 198.

*Anchusa officinalis*. Cl. V.

*Anchusa foliis lanceolatis, spiciis imbricatis secundis*, L. 156. I. Buglossum.


- a. Perianthium 5partitum cum bractea.
  - b. Corolla monopetala infundibuliformis, limbo semiquinquesido.
  - c. Eadem aperta cum staminibus 5, et 5 squamulis stamina regentibus.
  - d. Stamen separatum.
  - e. Germina 4, cum stylo filiformi et stigmate obtuso emarginato.
  - f. Semen in sinu calycis.
- Sponte crescit in locis incultis lapidosis, altitudine 3—4 pedum, floret Julio.

### Tab. 199.

*Polygala vulgaris*. Cl. XVII.

*Polygala floribus cristatis racemosis, caulibus herbaceis simplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis*, L. 531.

- a. Perianthium triphyllum.
- b. Corolla papilionacea.
- c. c. Alae duae.
- d. Vexillum cum carina.
- e. Vexillum apertum.
- f. Vexillum cum staminibus 8 connatis.
- g. Ger-



- g. Der Fruchtknoten mit dem einfachen Griffel und der 2spaltigen Narbe.  
 h. Die 2fächerige Saamentapsel.  
 i. Eben diese von oben anzusehen, mit den 2 Saamen.  
 k. Saamen.

Wächst auf trockenen Wiesen, an Wegen, wird 6—8 Zoll hoch, blüht im Junius.

- e. Germen cum stylo simplici et stigmate bifido.  
 h. Capsula bilocularis.  
 c. Eadem à parte superiore cum feminibus binis.  
 k. Semen.

Crescit in pratis siccis, ad vias, altitudine 6—8 pollicum, floret Junio.

## 200. Tafel.

Alpbalsam. Pl. G. 591. 10 Klasse.  
 Alprosen.  
 Linne Pf. G. 3 Th. G. 553.

- a. Die 5theilige Blumendecke.  
 (Sie war bei allen meinen Exemplaren kaum sichtbar.)  
 b. Die einblättrige trichterförmige Krone, mit 5theiliger Mündung.  
 c. Eben diese aufgeschnitten mit den 10 Staubfäden.  
 d. Ein abgesonderter Staubfaden.  
 e. Der 5eckigte Fruchtknoten mit dem Griffel und der stumpfen Narbe.  
 f. Eben dieser die Quere durchschnitten.

Wächst auf unsern Bergen, die Stauden sind oft 3—4 Fuß lang, legen sich aber auf den Boden, sie blühen im Junius.

## Tab. 200.

- Rhododendron ferrugineum.  
 Cl. X.  
 Rhododendron foliis glabris subtus leprosis, corollis infundibuliformibus. L. 337. I.  
 Chamaerhododendros alpina glabra.  
 a. Perianthium 5partitum.  
 (Vix notabile, in omnibus, quae mihi ad manus venerunt plantis.)  
 b. Corolla monopetala infundibuliformis, limbo 5 partito.  
 c. Eadem aperta cum staminibus 10.  
 d. Stamen separatum.  
 e. Germen pentagonum cum stylis et stigmate obtuso.  
 f. Idem transversim dissectum.

Crescit in montibus nostris, frutices saepius longitudine 3-4 pedum, sed incumbentes, Junio florent.





*Polygala vulgaris.* L.






*Rhododendron ferrugineum*. L.



# Index Centuriae II.


*Nota. Litterae majores nomina trivialia Linnaei indicant.*

	Tab.		Tab.
<b>A</b> corus vulgaris	187	CARTHAMVS TINCTORIVS	140
ACTAEA SPICATA	176	Caryophyllata aquatica	175
Acus veneris	135	Cataputia major	131
Adiantum album	162	CEANOTHVS AMERICANVS	167
ADONIS VERNALIS	182	CENTAVREA BENEDICTA	122
AJUGA PYRAMIDALIS	101	Centaureum minus	154
ANAGALLIS ARVENSIS	145	Cerasus avium	177
Anblatum fl. è rufo can- dic.	110	Chaerifolium	192
ANCHUSA OFFICINALIS	198	Chamaerhododendros al- pina glabra	200
ANTHEMIS NOBILIS	161	Chamomilla romana	161
Apium anisum dictum	128	Christophoriana	176
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS	98	CICER ARIETINVM	146
ARISTOLOCHIA ROTUNDA	125	Cicer fativum fl. candido	146
ASOARAGVS OFFICINALIS	105	Citronella	134
ASPLENIVM RVTA MVRA- RIA	162	Cnicus fativus	140
AVRELIANA CANADENSIS	155	Cnicus sylvestris hirsutior	122
Auricula muris	174	COLCHICVM AVTVMNALE	133
Barba caprae	141	Colchicum commune	133
BETONICA OFFICINALIS	143	Consolida major	137
BORRAGO OFFICINALIS	147	Consolida minor	156
Branca v. pata lupina	114	Consolida media prat. coe- rul.	101
Buglossum	198	CONVALLARIA MVLTIFLORA	172
Bugula	101	CONVALLARIA POLYGONA- TVM	171
Bupthalmum	182	Cornus hortensis	129
BUXVS SEMPERVIRENS	181	CORNVS MASCULA	129
Buxus	181	Crocus officinalis	151
Calamintha montana magno flore	111	CROCVS SATIVVS	151
Canariense semen	118	Cuminum nigrum	119
Cardiaca	114	Dentaria major	110
Cardopatia	168	Echioglossum	126
Carduus benedictus	122	ECHIVM VVLGARE	149
Carduus mariae v. lacteus	130	ERICA VVLGARIS	102
CARDVVS MARIANVS	130	ERYNGIVM CAMPESTRE	135
CARLINA ACAYLIS	168		



	Tab.		Tab.
Fagopyrum	106	MESPILVS GERMANICA	190
GENTIANA CENTAVRIVM	154	Morus diaboli	150
Geum palustre	175	MORVS NIGRA	173
GEVM RIVALE	175	Muscus catharticus	138
Ginseng	155	Muscus islandicus	138
Gramen parnassi	123	Myrrhis odorata	195
HELLEBORVS NIGER	185	MYRTVS COMMVNIS	169
Helxine	121	Myrtus Italica	169
Hepatica alba	123	Nasturtium aquaticum	144
Herba cancri	158	NIGELLA SATIVA	119
HIERACIVM PILOSELLA	174	Ninsing radix	155
IASMINVM OFFICINALE	153	ONONIS ARVENSIS	132
INDIGOFERA TINCTORIA	183	OPHIOGLOSSVM VVLGATVM	126
IRIO FLORENTINA	186	PANAX QVINQVEFOLIVM	155
IRIS GERMANICA	188	Papaver erraticum	157
Iris nostras	188	PAFAVER RHODES	157
IRIS PSEVD'ACORVS	187	PARIETARIA OFFICINALIS	121
Iris vulgaris	188	PARNASSIA PALVSTRIS	123
ISATIS TINCTORIA	191	PHALARIS CANARIENSIS	118
IVNIPERVS COMMVNIS	178	Phu vulgare	117
Lapathum sanguineum	127	Phyllirea	112
LATHRÆA SQVAMARIA	110	PHYTOLACCA DECANDRA	164
LAVRVS SASSAFRAS	196	PIMPINELLA ANISVM	128
LEONVRVS CARDIACA	114	Pimpinella Italica s. nigra	184
LICHEN ISLANDICVS	138	PIMPINELLA MAGNA	108
LIGVSTRVM VVLGARE	112	Pimpinella saxifraga maj.	
Lingua serpentaria	126	umb. rub.	108
Lychnis sylv. quae saponar.		PLANTAGO PSYLLIVM	115
vulgo	136	POLYGALA vulgaris	199
LYCIVM AFRVM	159	POLYGONVM FAGOPYRVM	106
Lyringium	135	PRVNELLA VVLGARIS	156
LYTHRVM SALICARIA	113	PRVNVS PADVS	177
Marrubium cardiaca di-		Psevdacorus	187
ctum	114	Pulicaria	115
MATRICARIA CHAMOMILLA		PYROLA ROTVNDIFOLIA	193
	139	RANVNCVLVS ACRIS	194
MATRICARIA PARTHENIVM	166	Regina pratorum	141
Melampodium	185	Resta bovis	132
Melanthium	119	Rhodia	180
MELISSA CALAMINTHA	111	RHODIOLA ROSEA	180
MELISSA OFFICINALIS	134	RHODODENDRON FERRVGI-	
MERCVRIALIS ANNVA 103.	104	NEVA	200
Mercurialis testiculata s.		RICINVS COMMVNIS	131
mas	103	Rosaria	180






RUMEX SANGVINEVS	Tab. 127	Sonchus laevis lacin. la- tifol,	Tab. 148
RUTA GRAVEOLENS	163	SONCHVS OLERACEVS lae- vis	148
Ruta hortensis	163	Spina alba	130
Ruta muraria	162	SPIRÆA VLMARIA	141
Salicaria	113	SYMPHITVM OFFICINALE	137
Salvia hortensis	165	Tamariscus germanica	170
SALVIA OFFICINALIS	165	TAMARIX GERMANICA	170
SANGVISORBA OFFICINA- LIS	184	TEVCRIVM CHAMÆPITHVS	120
SANICVLA EVROPÆA	109	Thapsus barbatus	197
SAPONARIA OFFICINALIS	136	THLASPI BVRSÆ PASTORIS	158
Sassafras	196	TRAGOPOGON PRATENSE	179
SCABIOSA ARVENSIS	142	TRIGONELLA FOENVM GRÆ- CVM	116
SCABIOSA SVCCISA	150	Triticum faginum	106
SCANDIX CEREFOLIVM	192	VRTICA PILVLIFERA	107
SCANDIX ODORATA	195	Valeriana minor	117
Sedum majus vulgare	124	VALERIANA OFFICINALIS	117
SEMPERVIVVM TECTORVM	124	Veratrum nigrum	185
SENECIO VVLGARIS	160	VERBASCVM THAPSVS	197
Sigillum Salomonis	171	VERONICA OFFICINALIS	189
SINOPIS NIGRA	152	Viperina	149
SISYMBRIVM NASTVRTIVM	144		

## Register.

Note. Die mit Schwabacher-Schrift gedruckte  
Namen sind die Planerischen deutschen  
Gattungsnamen.

Adonis	£. 182	Bergmelisse	£. 111
Altermann	187	Bergmünze	111
Altermünze	111	Betonie	143
Alpbalsam	200	Bibernell	108. 128
Alprosen	200	Bibernell welsche	184
Alpfer	127	Bienenkraut	134
Anis	128	Bingelkraut	103. 104
St. Antonikraut	156	Blanc Gukuf	101
Apostelkraut	142	Boksbart	179
Augenwurz	117	Boksdorn afrikanischer	159
Baldrian	117	Bokshorn	116
Beinwell	137	Boragen	147
Beinwurz	137	Borettsch	147
Bengelkraut	103	Brachendistel	135
		Brande	





Brandspizen	L. 160	Grindwurz; rothblättrige	L. 127
Braunelle	156	Güldengünnel	101
Brunnenkresse	144	Güldenwundkraut	101
Buchs	181	Günnel	101
Buchsodorn	159	Haberwurz	179
Buchwaizen	106	Habichtkraut	174
Burbaum	181	Hanenfuss	194
Ceanothus amerikanischer	167	Hartriegel	112
Chamille	139	Hasetohl	148
Chamille edle römische	161	Haubeckel	132
Chamomille	161	Hauslauch	124
Christophskraut	176	Hauswurz	124
Christwurz	185	Heide	102
Citronenmelisse	134	Heidekorn	106
Distel	130	Heidekraut	102
Dürrlizen	129	Herbstblumen	133
Duztblume	124	Herzgespankraut	114
Eberwurz	168	Herzkraut	134
Ehrenpreis	189	Hirtentafche	158
Einblatt	123	Hohlwurz; runde	125
Ellend	135	Holzmangold	193
Elfenbeere	177	Hünerdarm	145
Erdgallen	154	Hundshoden	133
Erdkieser	120	Hundskohl	103
Fakel	197	Jasmin	153
Faulbaum grüner	112	Indig	183
Fenchelholz	196	Johanniswedel	141
Fieberkraut	154	Jländisches Moos	138
Flechte	138	Kahlkraut	110
Flöhsamenkraut	115	Kalaminthe	111
Flößblume	122	Kanarifamen	118
Gänse-distel	148	Kardobenediktenkraut	122
Gärtern	129	Kazeuwurz	117
Gamander	120	Kerbel	192. 195
Garaffel	175	Kermesbeere	164
Gartenraute	163	Kichern	146
Gauchheil	145	Klapperrosen	157
Geisbart	141	Knöterich	106
Gentiane	154	Königskerze	197
Gefegnete Distel	122	Körbel; welscher; spanis	
Glanzgras	118	cher	195
Glasakraut	121	Körfelkraut	192
Gnadenkraut	121	Kollmarkkraut	145
Goldakraut	160	Kornelkirschen	129
Gottheil	156	Kornrosen	157



Kraffwurzel	T. 155	Pimpinelle	T. 108
Kraffwur; nordamerikanische	155	Porst	170
Krausdistel	135	Prunellenkraut	156
Kreuzblume	199	Radendistel	135
Kreuzkraut	160	Ramsell	199
Kreuzwur;	110. 160	Rauken	144
Küchererbsen	146	Reute	163
Kühkraut	103	Reihnweide	112
Leberblume	123	Rhodisernwur;	180
Lorbeer	196	Rommen	139
Lorenzkraut	101	Rosenwur;	180
Mainur;	110	Rothe Myre	145
Manstreu	135	Ruhrkirschen	129
Mariendistel	130	Säfelblume	167
Mauerkraut	121	Säfelkraut	158
Maulbeer	173	Saffor	140
Maulbeerbaum schwarzer	173	Safran	151
Mauerraute	162	Safran wilder	133. 140
Mausohrlein	174	Salbey Gartens	165
Melisse	111. 134	Sanikel	109
Mespe	190	Sassafras	196
Metter	139. 166	Scabiose	142. 150
Mispeln	190	Schlagkraut	120
Mohn	157	Schmeernur;	137
Mundhol;	112	Schminwur;	171. 172
Mutterkraut	166	Schnallenblumen	157
Mutterkraut wildes	114	Schwarakraut	142
Nycten	169	Schwarzer Kummel	119
Nagelkraut	174	Schwarzwur;	137. 176
Nardensaame	119	Schwertel	186. 187. 188
Natterkopf	149	Schwertel blaue	188
Natterzunge	126	Schwertel gelbe	187
Nessel römische	107	Schwertelilie gelbe	187
Nieswur; schwarze	185	Schuppenwur;	110
Ochsenbrechwur;	132	Seifenkraut	136
Ochsenzunge	198	Seifenwur; rothe	136
Ochsenzunge wilde	149	Senf	152
Ohnblatt	110	Sonchen	148
Osterluzey runde	125	Spargel	105
Partife	113	Speknelbe	103
Peterkraut	121	Spierstaude	141
Pfaffenblümlein	143	Spinblumen	133
Pflaumen	177	Spinnendistel	122
Phytolais virginische	164	Stallkraut	132
		Steinpeterlein	108. 184
		R.	Stein;

Steinraute	T. 162	Wasserbenediktswurz	T. 175
Sereisenfarn	162	Wasserkresse	144
Streuweiz	110	Weiderich: rother: braun:	
Tag und Nachtkraut	121	ner	113
Tamaristenstrauch	170	Weinraute	163
Taschelkraut	158	Weizwurz	171. 172
Tasche	158	Wegerich	115
Tausendguldenkraut	154	Wiesengaraffel	175
Tehfels Abbis	150	Wiesentknopf	184
Thedistel	130	Wintergrün	193
Thellwurz florentinische	186	Wollkraut	197
Thellwurz gemeine	188	Wolfsstrapp	114
Nichwurz	186	Wunderbaum	131
Nogelkraut	145	Zahnkraut	110
Wacholder	178	Zaunfarn	171. 172
Waid	191	Zäunriegel	112
Waid wilder	136	Zehrtraut	143
Waldmangold	193	Zeitlosen	133
Wallwurz	137	Ziser	146

## Index Systematicus.

### Ex Classe 2. Linnaei.

Ligustrum vulgare	Tab. 112
Iatrinum officinale	153
Veronica officinalis	189

### Ex Classe 3.

Valeriana officinalis	117
Phalaris canariensis	118
Crocus sativus	151
Iris florentina	186
Iris Pseud' acorus	187
Iris germanica	188

### Ex Classe 4.


Plantago psyllium	115
Cornus mascula	129
Scabiosa arvensis	142

Scabiosa succisa	Tab. 150
Sanguisorba officinalis	184

### Ex Classe 5.

Pimpinella magna	108
Sanicula Europaea	109
Parnassia palustris	123
Pimpinella anisum	128
Eryngium campestre	135
Symphitum officinale	137
Anagallis arvensis	145
Borago officinalis	147
Echium vulgare	149
Gentiana centaurium	154
Lycium afrum	159
Ceanothus americanus	167
Tamarix Germanica	170
Scandix cerefolium	192
Scillaix edorata	195
Ver-	





Verbascum thapsus Tab. 197  
 Anchusa officinalis 198

### Ex Classe 6.

Asparagus officinalis 105  
 Rumex sanguineus 127  
 Colchicum autumnale 133  
 Convallaria polygonatum 171  
 Convallaria multiflora 172

### Ex Classe 8.

Erica vulgaris 102  
 Polygonum sagopyrum 106

### Ex Classe 9.

Laurus sassafras 196

### Ex Classe 10.

Saponaria officinalis 136  
 Ruta graveolens 163  
 Phytolacca decandra 164  
 Pyrola rotundifolia 293  
 Rhododendron ferrugineum 200

### Ex Classe 11.

Lythrum salicaria 113  
 Sempervivum tectorum 124

### Ex Classe 12.

Spiraea ulmaria 141  
 Myrtus communis 169  
 Geum rivale 175  
 Brunus padus 177  
 Mespilus germanica 190

### Ex Classe 13.

Nigella arvensis 119

Papaver thaeas Tab. 157  
 Actaea spicata 176  
 Adonis vernalis 182  
 Helleborus niger 185  
 Ranunculus acris 194

### Ex Classe 14.

Ajuga pyramidalis 101  
 Lathraea squamaria 110  
 Melissa calamintha 111  
 Leonurus cardiaca 114  
 Teucrium chamaepithys 120  
 Melissa officinalis 134  
 Betonica officinalis 143  
 Prunella vulgaris 156

### Ex Classe 15.

Sisymbrium nasturtium 144  
 Sinapis nigra 152  
 Thlaspi bursa pastoris 158  
 Isatis tinctoria 191

### Ex Classe 17.

Trigonella foenum graecum 116  
 Ononis arvensis 132  
 Cicer arietinum 146  
 Indigofera tinctoria 183  
 Polygala vulgaris 199

### Ex Classe 19.

Centaurea benedicta 122  
 Carduus marianus 130  
 Matricaria chamomilla 139  
 Carthamus tinctorius 140  
 Sonchus oleraceus laevis 148  
 Senecio vulgaris 160  
 Anthemis nobilis 161  
 Matricaria parthenium 166  
 Carlina acaulis 168  
 Hieracium pilosella 174  
 Tragopogon pratensis 179  
 Ex



Ex Classe 20.

Aristolochia rotunda 125

Ex Classe 21.

Urtica pilulifera 107  
 Ricinus communis 131  
 Morus nigra 173  
 Buxus sempervirens 181

Ex Classe 22.

Mercurialis annua 103. 104

Iuniperus communis 178  
 Rhodiola rosea 180

Ex Classe 23.

Parietaria officinalis 121  
 Panax quinquefolium 155

Ex Classe 24.

Ophioglossum vulgatum 126  
 Lichen islandicus 138  
 Asplenium ruta muraria 162

